

Apresentações Orais



70
SIMPÓSIO PARAIBANO DE
MEDICINA
DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

20
ENCONTRO DE
EGRESSOS

Anais

REVISTA CIENTÍFICA

Integr@ção

(ISSN Impresso: 1809-8320)



PATOS-PB
2023

REVISTA CIENTÍFICA

Integr@ção

(ISSN Impresso: 1809-8320)

<https://integracao.unifip.edu.br>



ORGANIZAÇÃO GERAL

Coordenação do Núcleo de Práticas Extensionistas e Investigativas em Saúde
Coordenação do Programa de Acompanhamento de Egressos

COMISSÃO ORGANIZADORA

Profª Dra Milena Nunes Alves de Sousa – UNIFIP
Prof Me Umberto Marinho de Lima Júnior – UNIFIP
Prof Me Miguel Aguila Toledo – UNIFIP
Prof Dr Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira - UNIFIP
Profª Ma Luana Idalino da Silva - UNIFIP
Profª Drª Nara Maria Holanda de Medeiros - UNIFIP
(Organizadores)

REVISTA CIENTÍFICA

Integr@ção

(ISSN Impresso: 1809-8320)

<https://integracao.unifip.edu.br>



COMISSÃO CIENTÍFICA

Prof Dr Fabrício Kleber de Carvalho
Prof Dr Laerge Thadeu Cerqueira da Silva
Prof Dr Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira
Prof Esp José Begue Moreira de Carvalho
Prof Esp. Tiago Bruno Carneiro de Farias
Prof Me Brunno Marcondes de Lima
Prof Me Everson Vagner de Lucena Santos
Prof Me Miguel Aguila Toledo
Prof Me Umberto de Lima Júnior
Profª Drª Gisele de Medeiros Costa One
Profª Drª Milena Nunes Alves de Sousa
Profª Drª Nara Maria Holanda de Medeiros
Profª Drª Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira
Profª Drª Viviane Priscila Barros de Medeiros
Profª Esp Isadélia Constâncio de Oliveira
Profª Esp Luysa Gabrielly de Araújo Moraes
Profª Esp Thuany Rodrigues Dias
Profª Esp. Rafaela de Albuquerque Paulino
Profª Ma Alanna Michely B. de Moraes
Profª Ma Charlene de Oliveira Pereira
Profª Ma Hirisleide Bezerra Alves
Profª Ma Luana Idalino da Silva

REVISTA CIENTÍFICA

Integr@ção

(ISSN Impresso: 1809-8320)

<https://integracao.unifip.edu.br>



Apresentações Orais

SUMÁRIO

- 1 COMO PARAR DE FUMAR EM MEIO ÀS SITUAÇÕES DO COTIDIANO?
- 2 BEM-ESTAR EMOCIONAL: COMO REDUZIR O ESTRESSE
- 3 HIGIENE DO SONO: UMA ABORDAGEM SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SONO PARA A SAÚDE
- 4 VITAMINAS E MINERAIS SUPLEMENTADOS NA INFÂNCIA
- 5 SERÁ QUE EXISTE O USO RACIONAL DO ÁLCOOL?
- 6 TRATAMENTO NUTRICIONAL NO TRANSTORNO ALIMENTAR RESTRITIVO EVITATIVO
- 7 COMO A ATIVIDADE FÍSICA AUMENTA A PRODUTIVIDADE E MELHORA A QUALIDADE DE VIDA
- 8 IMPORTÂNCIA DO SONO PARA A SAÚDE E BEM-ESTAR
- 9 USO DO ÁLCOOL E IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA
- 10 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE ESTRESSE EM RELAÇÃO AO MÉTODO CONTRACEPTIVO UTILIZADO
- 11 ESCOLHA DO PARTO CESÁREO E A RELAÇÃO COM AUTOESTIMA
- 12 PRINCIPAIS IMPACTOS GERADOS PELAS LACUNAS NO ENSINO MÉDICO QUE GERAM ESTRESSE GENERALIZADO NA VIDA DOS ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DA MEDICINA
- 13 COMPORTAMENTO SEXUAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA E SUA RELAÇÃO COM AUTOESTIMA
- 14 ATIVIDADE FÍSICA E A INFLUÊNCIA NOS NÍVEIS DE ANSIEDADE DOS ESTUDANTES DE MEDICINA
- 15 CONHECER O PERFIL DO ESTUDANTE DE MEDICINA E SEUS PRINCIPAIS ENFRENTAMENTOS DIÁRIOS RELACIONADO AO ESTRESSE
- 16 CRENÇAS POPULARES RELACIONADAS AO USO DE ANTICONCEPCIONAL ORAL E AUTOESTIMA
- 17 PANDEMIA DO COVID-19: HÁ ASSOCIAÇÃO COM QUADROS DE AMNÉSIA?
- 18 POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS PARA MELHORIAS DOS SINTOMAS CLÍNICOS NA ESCLEROSE MÚLTIPLA
- 19 EXPOSIÇÃO DIGITAL ÀS TELAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
- 20 TERAPIAS COMPLEMENTARES PARA O TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE
- 21 VIABILIDADE DA CANNABIS NO TRATAMENTO DE ALZHEIMER
- 22 USO TERAPÊUTICO DA TOXINA BOTULÍNICA NO TRATAMENTO DA ENXAQUECA
- 23 A INFLUÊNCIA DO IODO NO QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA
- 24 CUIDADO AOS FUMANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE BRASILEIRA
- 25 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COMO ALTERNATIVA NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE PARKINSON

v. 4, n. especial 1, p. 1-62 (2023): Revista Científica Integraç@o.
(ISSN Impresso: 1809-8320)

Os textos apresentados são de criação original dos autores, que responderão individualmente por seus conteúdos ou por eventuais impugnações de direito por parte de terceiros

SUMÁRIO

- 26 TREINAMENTO RESISTIDO E EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO MUSCULAR NO MANEJO DA FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
- 27 USO DE IMUNOBIOLOGICOS EM COMPARAÇÃO AO DE CORTICÓIDES NO TRATAMENTO DA ARTRITE PSORIÁSICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
- 28 EFICÁCIA DA NEUROMODULAÇÃO NO TRATAMENTO DA ENXAQUECA CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
- 29 USO DO CANABIDIOL COMO COADJUVANTE VERSUS O NÃO USO EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
- 30 ANTIDEPRESSIVOS E PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM PACIENTES PORTADORES DA FIBROMIALGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA
- 31 ARTRITE REUMATOIDE VERSUS FREQUÊNCIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
- 32 SEQUELAS MÚSCULOS ESQUELÉTICAS EM PACIENTES ADULTOS JOVENS E IDOSOS QUE TIVERAM INFECÇÃO PELO COVID-19
- 33 USO DO ÁCIDO FÓLICO NO FECHAMENTO DO TUBO NEURAL NO PRIMEIRO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
- 34 EFICÁCIA DO CANABIDIOL EM DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS
- 35 ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS NA MESORREGIÃO DO SERTÃO PARAIBANO
- 36 HANSENÍASE E SEUS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS NA REGIÃO DO CARIRI NO CEARÁ DO ANO DE 2021 A 2023
- 37 ANÁLISE COMPARATIVA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE DO SERTÃO PARAIBANO
- 38 O IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NA ADESÃO AOS TESTES DE HIV DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI – CRAJUBAR/CE
- 39 INFLUÊNCIA DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS CRÔNICAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DUAS CIDADES DO ALTO DO SERTÃO PARAIBANO
- 40 AIDS NAS CAPITAIS BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CASOS DIAGNOSTICADOS E TESTES REALIZADOS EM 2021
- 41 NÚMERO DE TESTES DE HIV REALIZADOS NO ANO DE 2021 NA 6ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL
- 42 SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA: REALIZAÇÃO DE TESTES NA REGIÃO SERIDÓ, RIO GRANDE DO NORTE – BRASIL – NO PERÍODO DE 2019 A 2022
- 43 AVALIAÇÃO DOS TESTES DE SÍFILIS DURANTE A GESTAÇÃO NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE
- 44 DESAFIOS DO DIAGNÓSTICO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

SUMÁRIO

- 45 EFEITO DA MELATONINA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
- 46 A EFICÁCIA DA TIRZEPATIDA NA DIABETES MELLITUS TIPO 2: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
- 47 EFEITOS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM PESSOAS COM FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
- 48 ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA NA PREVENÇÃO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
- 49 PANORAMA ATUAL DA PESQUISA EM TRATAMENTO ANTIVIRAL PARA MONKEYPOX: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA ZONOSE QUE PREOCUPOU O PLANETA
- 50 A CURA PELA FÉ: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
- 51 ESPOROTRICOSE: ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES NO PERÍODO DE 2014 A 2023 E DOS INDICADORES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA GLOBAL
- 52 TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH) EM ADULTOS: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
- 53 A MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (MFC): O PROFISSIONAL E SUA IMPORTÂNCIA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 – ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

TRABALHOS PREMIADOS



1o LUGAR:

PANORAMA ATUAL DA PESQUISA EM TRATAMENTO ANTIVIRAL PARA MONKEYPOX: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA ZONOSE QUE PREOCUPOU O PLANETA

Gabriel dos Santos Medeiros, Ana Caroliny Suassuna de Aquino, Bruna Alves Olegário, Luiz Antônio Barbosa de Figueiredo & Everson Vagner de Lucena Santos

USO DO CANABIDIOL COMO COADJUVANTE VERSUS O NÃO USO EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Monalisa Maria de Souza Fernandes Paulo, Luiz Henrique Celestino Camboim Sousa, Giovanna Kailany Machado de Oliveira Moura, Denis Mateus dos Santos Penha, Antônio Reney Beserra de Araújo, Francisco de Assis Remígio III & Milena Nunes Alves de Sousa



2o LUGAR:

BEM-ESTAR EMOCIONAL: COMO REDUZIR O ESTRESSE

Débora Rayane Lacerda Da Silva, Gabriela Fortes, Maria Clara Moraes Medeiros Cabral, Maria Emanuely Batista Lacerda, Vitoria Gabriele Silva Cavalcante & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira



3o LUGAR:

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH) EM ADULTOS: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Ana Julia dos Santos Brito, Christianny Louyse de Freitas Costa, Laylla Lorena Araújo Cunha, Maria Eduarda Medeiros Alves, Maria Eduarda Souza Valdevino, Uyara da Silva Xavier & Everson Vagner de Lucena Santos

A INFLUÊNCIA DO IODO NO QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA

Ramon Pereira Martins, Ingrid Dantas Rodrigues, Larissa Pinheiro de Araújo, Jordânia Letícia Ferreira de Oliveira, Karolaynny Alencar Diniz, Luciana Clédina Bezerra Lopes, Wanderson Gabriel de Brito Limeira & Milena Nunes Alves de Sousa

v. 4, n. especial 1 (2023): Revista Científica Integraç@o.
(ISSN Impresso: 1809-8320)

Os textos apresentados são de criação original dos autores, que responderão individualmente por seus conteúdos ou por eventuais impugnações de direito por parte de terceiros



COMO PARAR DE FUMAR EM MEIO ÀS SITUAÇÕES DO COTIDIANO?

Fabília Dalana de Sousa Neves, Isadora Vanessa Fernandes Vasconcelos,
Lucas Mateus Bertozo de Lima Ângelo Wévelly de Lima Guedes, Camilly de
Oliveira Monte & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: O tabagismo está associado a inúmeros malefícios fisiológicos se apresentando como a principal causa de morte evitável no mundo, sendo este influenciado por transtornos psicoemocionais que dificultam a sua cessação. **OBJETIVO:** Explicar como os transtornos psicológicos e emocionais afetam negativamente no abandono do tabagismo crônico e analisar métodos eficientes para esse fim por meio da criação de uma cartilha informativa. **MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos em revistas reconhecidas nos bancos de dados do Scielo entre o período de 2019 a 2022 com enfoque em 4 artigos após aplicação do critério de estar relacionado ao tema. **RESULTADOS:** Podemos observar que dos participantes das pesquisas existe prevalência do tabagismo em pessoas inseridas em grupos sociais em que já haviam fumantes, e estes, ao cessarem o uso contínuo do tabaco apresentam ansiedade generalizada, episódios depressivos e para os que já possuíam tais transtornos seus sintomas se intensificaram. O resultado disso é uma síndrome de abstinência intensificada e uma maior dificuldade de findar o hábito de fumar. **CONCLUSÃO:** Esse estudo propiciou uma ampla visão de que o tabagismo, além de afecções fisiológicas, apresenta um risco potencial para o desenvolvimento de transtornos mentais e o agravamento dos mesmos em pessoas que já os apresentavam. Conclui-se que são necessários métodos de amplo espectro para tornar mais fácil a abstinência da nicotina, por exemplo o uso de fármacos associados a terapias ocupacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Nicotina; Tabaco; Ansiedade; Psicoemocionais; Abstinência; Tabagismo.



BEM-ESTAR EMOCIONAL: COMO REDUZIR O ESTRESSE

Débora Rayane Lacerda Da Silva, Gabriela Fortes, Maria Clara Moraes
Medeiros Cabral, Maria Emanuely Batista Lacerda, Vitoria Gabriele Silva
Cavalcante & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O bem-estar é um aspecto que facilita o modo como nos enxergamos e aos que estão ao nosso redor, e está diretamente ligado à saúde. Já o estresse é o meio como se reage emocionalmente a uma determinada situação vivenciada no cotidiano. Visto que, estão interligados, é necessário avaliar o meio biopsicossocial do indivíduo identificando recursos, evitando efeitos negativos em seu bem-estar emocional. **Objetivo:** Orientar sobre bem-estar emocional e viabilizar meios sobre como reduzir o estresse através da construção de uma cartilha. **Metodologia:** Este estudo é uma revisão da literatura, realizada entre 2020 e 2023, por meio de pesquisas no banco de dados SciELO, biblioteca virtual universitária da UFRJ e web sites obtendo 7 artigos através dos seguintes descritores: Bem-estar. Estresse. Emocional. **Resultados:** Mediante o que foi visto, é possível observar alguns fatores que têm relação direta com o bem estar do indivíduo, como por exemplo, o estilo de vida: pessoas que praticam o autocuidado, exercícios físicos, uma boa alimentação e possuem um biopsicossocial estável possuem um maior nível de bem-estar. Porém, existem outros fatores que afetam esse bem-estar, como: fator econômico, social, profissional, comportamental. No entanto, a compreensão da comodidade em geral, é um aspecto que facilita o modo como compreende-se o que está no dia a dia, fortalecendo relações sociais e garantindo uma maior estabilidade emocional. **Conclusão:** A qualidade de vida do indivíduo possui forte ligação com o bem-estar emocional, está diretamente ligado à saúde e a longevidade, o mesmo é impactado por quadros de estresse, que podem desencadear uma série de problemas. Embora boa parte da população conheça a importância de evitar a exposição ao estresse, é evidente a necessidade de reconhecer os sinais e adotar hábitos de autocuidado, visando a melhoria da saúde emocional, e da qualidade de vida.

Palavras-chave: Bem-estar. Estresse. Emocional.



HIGIENE DO SONO: UMA ABORDAGEM SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SONO PARA A SAÚDE

Andrea Italiano da Nóbrega Figueiredo Araújo, Jaqueline Ximenes Figueirêdo de Moraes, José Candido de Almeida Neto, Kamila Mota de Lima, Radimael da Silva Cavalcante & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: O sono é uma necessidade fisiológica fundamental para o organismo humano, desempenhando funções importantes na regulação do metabolismo e psiquismo, além de ter um papel restaurador e protetor. No entanto, a falta de sono adequado pode ter impactos negativos na saúde física e mental. **OBJETIVO:** Analisar uma abordagem sobre a importância do sono para a saúde, enfatizando a higiene do sono como um conjunto de hábitos e práticas que podem melhorar a qualidade do sono e prevenir distúrbios do sono através da construção de uma cartilha informativa. **MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scopus e PubMed, com os seguintes descritores: sono, higiene do sono, distúrbios do sono e saúde do sono. Obtendo-se 6 artigos científicos relacionados ao tema da higiene do sono e sua importância para a saúde humana. **RESULTADOS:** Os resultados da revisão indicam que o sono é fundamental para a saúde humana, tendo um papel importante na regulação do metabolismo e psiquismo, no controle do estresse, no humor e na memória. Além disso, foi constatado que a necessidade de horas de sono varia conforme a idade, e que os distúrbios do sono podem levar a diversas consequências negativas para a saúde. **CONCLUSÃO:** Assim, a higiene do sono deve ser considerada uma parte fundamental dos cuidados com a saúde, e que hábitos saudáveis podem ser adotados para melhorar a qualidade do sono. E que é importante também que profissionais de saúde estejam atentos aos problemas relacionados ao sono e que orientem seus pacientes sobre como melhorar a qualidade do sono.

PALAVRAS-CHAVE: sono, higiene do sono, distúrbios do sono, saúde, qualidade de vida.



VITAMINAS E MINERAIS SUPLEMENTADOS NA INFÂNCIA

AJoan Ravy Sousa Lacerda, Júlia Saraiva Silva, Kelson Emanuel Cavalcanti
Leite Filho, Maira Monteiro Amorim, Mellane Alves de Aguiar
& Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: As vitaminas e minerais exercem papel fundamental em diversos processos fisiológicos humanos, tendo sua deficiência associada a doenças e distúrbios especialmente na infância. **OBJETIVO:** Analisar a importância de vitaminas e sais minerais para a promoção da saúde infantil e elaborar uma cartilha informativa. **MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos bancos de dados Pubmed, Scielo e Google acadêmico entre os períodos de 2015 a 2022, havendo seleção de 3 artigos após aplicação do critério que foi estar relacionado o tema específico. **RESULTADOS:** Podemos observar nesses estudos, que os micronutrientes desempenham diversas funções e que a deficiência de cada um se relaciona com alguma consequência, como a Vitamina A que se associa diretamente à prevenção de doenças infecciosas e sua carência constitui causa principal de cegueira evitável na infância, além das consequências no crescimento e alterações cutâneas e oculares. No Brasil, há uma prevalência da inadequada ingestão de 3 micronutrientes, o ferro, zinco e cálcio, gerando distúrbios como anemia ferropriva e imunossupressão. Sendo a alimentação equilibrada, tanto em aspectos quantitativos quanto qualitativos, a principal forma de receber esses nutrientes. **CONCLUSÃO:** Esse estudo proporcionou uma ampla visão sobre diversos aspectos dos distúrbios relacionados a carência de micronutrientes na infância. Sendo possível observar que essa carência é um fator de risco para o adoecimento, influenciando o aumento da incidência de morbidade e mortalidade na infância.

PALAVRAS-CHAVE: Vitaminas; Minerais; Suplementação; Infância.



SERÁ QUE EXISTE O USO RACIONAL DO ÁLCOOL?

Flayra Lopes Fragoso, Giselly Araújo Garcia, Anyelle Ferreira de Lima, Maria de Fátima Silva Crispim, Maria Luiza Dantas de Medeiros & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: O álcool se trata de uma droga psicoativa consumida mundialmente, sendo estimulada em diversos setores da sociedade, tornando-se, assim, responsável pelo desencadeamento de uma parcela relevante de doenças e mortes, além de gerar dependência em seus usuários. **OBJETIVO:** Esclarecer o público-alvo acerca da inexistência do consumo responsável do álcool, a fim contribuir na saúde e no bem-estar do corpo social em sua totalidade através da criação de uma cartilha. **MÉTODOS:** Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com artigos de 2003 a 2023, priorizando Qualis A, disponibilizados nos bancos de dados: Scielo, Google Acadêmico, CISA (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool) e BBC News (British Broadcasting Corporation) obtendo-se 15 artigos de interesse para o tema. **RESULTADOS:** Podemos observar por meio da leitura dos artigos o impacto do álcool na conjuntura populacional brasileira, já que tal componente, mesmo em mínimas quantidades, interfere no pleno funcionamento do organismo. Arelado a esse fato, foi feita a análise da dose padrão, a qual se manifesta em um limite proposto pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), que estabelece a ingestão de cinco ou mais doses como abusivas, tanto para homens, quanto para mulheres. A partir dessa pesquisa foram obtidos resultados que demonstraram maior prevalência do uso envolvendo o sexo masculino, adultos jovens, residentes de áreas urbanas e das regiões Centro-Oeste e Sudeste, como também a cor da pele preta e a maior escolaridade. **CONCLUSÃO:** Esse estudo proporcionou um aprimoramento da visão social do álcool através de evidências e descrições sobre a popularização dessa substância e os seus respectivos malefícios, capazes de gerar o processo de dependência química. A partir disso, tornou-se possível compreender categoricamente a respeito dessa droga lícita, como também a demonstração de mecanismos e ambientes especializados para a recuperação dos alcoólatras.

PALAVRAS-CHAVE: Droga psicoativa; Alcoólatra; Consumo; Dependência; Recuperação.



TRATAMENTO NUTRICIONAL NO TRANSTORNO ALIMENTAR RESTRITIVO EVITATIVO

Isis Karla Alves Medeiros da Silva Torres, José Ruzembergue Morais de Araújo,
Diego Ferreira Rodrigues, Samira Alencar Lustoza & Tiago Bezerra de Sá de
Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo (TARE) consiste em uma perturbação na alimentação ou forma de comer, como uma aparente falta de interesse pela comida, evitação dos alimentos de acordo com determinadas características sensoriais e preocupação com consequências aversivas do comer, levando a uma incapacidade persistente em atender às necessidades nutricionais do organismo. **OBJETIVO:** O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar os estudos, que abordam sobre o tratamento nutricional do TARE, com o intuito de auxiliar o profissional de nutrição na condução do tratamento adequado através da construção de uma cartilha informativa. **MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Pubmed e SciELO, utilizando como critérios de inclusão: tratamento, manejo e/ou gestão, cujo foco principal fosse tratamento nutricional da doença, não delimitando data de publicação. Foram encontrados 191 artigos, desses somente 36 estudos foram incluídos na síntese interpretativa. O ano com o maior número de publicações foi 2021. **RESULTADOS** Dentre os principais resultados, destacamos a necessidade de tratamento por uma equipe multidisciplinar treinada em transtornos alimentares, incluindo o profissional de nutrição, garantindo que o paciente tenha acesso à combinação médica, dietética e psicológica com maiores chances de sucesso e recuperação da saúde. **CONCLUSÃO:** Foram encontradas, incluindo validação de instrumentos para avaliação do TARE: caracterização e diferenciação da doença em relação à anorexia nervosa; sistematização do tratamento nutricional de acordo com cada subgrupo característico do transtorno e obtenção de dados epidemiológicos mais robustos.

PALAVRAS-CHAVE: restrição da ingestão de alimentos, neofobia alimentar, transtorno alimentar restritivo evitativo, transtorno alimentar



COMO A ATIVIDADE FÍSICA AUMENTA A PRODUTIVIDADE E MELHORA A QUALIDADE DE VIDA

Gabriela Alves Felix, Heloisa Roberta Liandro Alves, Juliet Layanny Medeiros
Perônico, Matheus Damascena Moraes, Priscila Ila Leite Guedes
& Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: A atividade física é essencial para a promoção da saúde e prevenção de diversas doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, muitos estudos têm investigado a relação entre a prática regular de atividade física e a melhoria da produtividade e da qualidade de vida. **OBJETIVO:** Analisar como a atividade física pode contribuir para o aumento da produtividade e melhoria da qualidade de vida, orientando por meio da construção de uma cartilha informativa. **MÉTODOS:** Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em bancos de dados como Pubmed, Scielo e Google Acadêmico, considerando artigos publicados no período de 2019 a 2021 e relacionados ao tema proposto. Após a aplicação dos critérios de seleção, foram selecionados 4 artigos para a análise dos resultados. **RESULTADOS:** Os estudos analisados mostraram que a prática regular de atividade física pode melhorar a disposição física e mental, aumentar a capacidade cognitiva, reduzir o estresse e ansiedade, além de promover a regulação do sono e a melhoria da saúde cardiovascular. Também foi verificado que atividades físicas em grupo ou em ambientes naturais podem contribuir para a melhoria da socialização e bem-estar emocional. **CONCLUSÃO:** Os resultados obtidos destacam a importância da prática regular de atividade física para a promoção da saúde física e mental, bem como para o aumento da produtividade e melhoria da qualidade de vida. Esses achados enfatizam a necessidade de incentivar e promover a atividade física na rotina das pessoas, visando a prevenção de doenças e o aumento da qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade física; Produtividade; Qualidade de vida; Saúde física; Saúde mental.



IMPORTÂNCIA DO SONO PARA A SAÚDE E BEM-ESTAR

Artur Lima Suassuna Abreu, Hellen Beatriz Noronha de Lucena, Heitor Wanderley de Sousa Gomes, José Batista de Oliveira Neto, Sérgio Victor Bezerra de Oliveira & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: O sono é uma necessidade fisiológica fundamental para o nosso organismo, ele mantém o equilíbrio psíquico, emocional e metabólico e restabelece a disposição para realizar as atividades do dia a dia. **OBJETIVO:** Analisar e expor informações por meio de uma cartilha, demonstrar o necessário para melhorar sua saúde do sono e como mantê-lo em dia. **MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos bancos de dados da Scielo, RPMGF e PSICO entre os períodos de 2006 a 2019, havendo seleção de artigos após aplicação do critério que foi estar relacionado ao tema específico. **RESULTADOS:** Podemos observar que dos participantes das pesquisas muitos possuem distúrbios do sono que desencadeiam consequências adversas à saúde e ao bem-estar dos indivíduos, Ademais, foi observado que nas pesquisas a duração do sono das pessoas, das crianças 56,3% e 41,1% no grupo pré-escolar e escolar, tem sono inferior a 8h, ideal mínimo é respectivamente 10h e 9h. Adolescentes de 12-18 anos dormem 7,35h e deveriam 8,33h. Adultos de meia idade tem durabilidade do sono de 6,8h e os mais jovens de 7,2h, o recomendado ideal mínimo são 7h. Em idosos 6,5 horas de sono diárias, abaixo do recomendado, 7h. **CONCLUSÃO:** Os distúrbios do sono afetam o trabalho, a cognição, os relacionamentos e o funcionamento diário, e a privação do sono, gera consequências que afetam o desempenho cognitivo em todas as faixas etárias.

PALAVRAS-CHAVE: Sono; Bem-Estar; Higiene do Sono; Dormir.



USO DO ÁLCOOL E IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA

Ana Karoline Alves de Brito Marques, Marcus Vinícius de Andrade Pereira,
Livia Araújo Wanderley, Izabella Águida Trindade da Nóbrega, Fábila Paloma
Costa de Almeida & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: O uso de substâncias lícitas é um problema alarmante na sociedade, por estar associado com acessibilidade e custo benefício das bebidas alcoólicas, principalmente os destilados que apresentam alta concentração de Etanol. **OBJETIVOS:** Analisar o funcionamento do Álcool no sistema nervoso central e o desenvolvimento do vício, promovendo orientações através da construção de uma cartilha. **MÉTODOS:** Pesquisa bibliográfica de artigos sobre o tema nos bancos de dados do Scielo, de depositórios do Centro Universitário de Brasília: Faculdade de Ciência da Saúde, o que resultou na seleção de 3 artigos após a aplicação do critério que foi estar relacionado ao tema específico. **RESULTADO:** O álcool influencia o sistema límbico, que é a junção de várias estruturas que tem a função de projetar as respostas emocionais. Quando há a ingestão do Álcool, há a liberação de dopamina, um neurotransmissor, mensageiros que transportam a informação dos neurônios. A dopamina é o causador do sentimento de prazer e a sensação de afinidade com o bem-estar, o que faz o indivíduo buscar cada vez mais a droga na tentativa de arcar com o prazer momentâneo. **CONCLUSÃO:** Esse estudo proporciona uma ampla visão sobre como ocorre a evolução do álcool no sistema nervoso, responsável pelo controle de sentimentos, assim como o uso exagerado pode levar ao vício devido a esses fatores neurológicos.

PALAVRAS-CHAVES: Substâncias lícitas; bebidas alcoólicas; vício.



ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE ESTRESSE EM RELAÇÃO AO MÉTODO CONTRACEPTIVO UTILIZADO

Izabelly Ferreira de Andrade, Fernanda Clara Marinheiro Oliveira, Iago Brenner
Farias Leal, Antônio Hítalo Mamédio Araújo, Bárbara Carlos Saraiva,
Amanda Miranda Xavier da Silva & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: Para optar por um método contraceptivo de forma livre e informada, as mulheres precisam conhecer e ter acesso a todos os métodos anticoncepcionais e o possível efeito negativo do método escolhido nos níveis de estresse. **OBJETIVO:** Conhecer o perfil social de uso dos contraceptivos e analisar o índice de estresse. **MÉTODOS:** Pesquisa através de questionários pelo Google Forms, pesquisa de campo tipo descritiva, transversal e com abordagem quantitativa e qualitativa. Os dados foram analisados utilizando-se a estatística simples e inferencial, fixando-se o intervalo de confiança em 95%. A análise dos dados será realizada através dos softwares Microsoft Excel®, versão 2019 e do IBM SPSS Statistics, versão 26. Serão coletadas médias, mínimo e máximo com desvio padrão para descrever o comportamento da amostra. Todas as análises estatísticas inferenciais serão realizadas no programa IBM SPSS Statistics, versão 26. **RESULTADOS:** A pesquisa foi realizada com 104 participantes, selecionados pelo método amostral não-probabilístico por conveniência. As idades variam de 18 a 47 anos ($M=29$; $DP=75$). Em relação ao método mais utilizado, a maioria faz uso de anticoncepcional oral (31,7%, $n=33$), preservativo feminino ou masculino (30,8%, $n=32$) ou não faz uso de nenhum método (12,5%, $n=13$). As correlações são não significativas ao utilizarmos o teste Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e correlação de Spearman. **CONCLUSÃO:** A partir dos dados colhidos e analisados, pode-se concluir que o tipo de método contraceptivo utilizado está diretamente relacionado ao nível de estresse individual. Além disso, percebe-se correlação indireta entre a quantidade de relações sexuais semanais e o nível de estresse, na qual quanto maior número de relações sexuais por semana menor o nível de estresse.

PALAVRAS-CHAVE: Estresse; Estatística, Método contraceptivo.



ESCOLHA DO PARTO CESÁREO E A RELAÇÃO COM AUTOESTIMA

Daniella Ribeiro Benício Alexandre, Eduarda Feitosa Bezerra, Laura Mourão Aragão, Lívia Layanne Lopes Fernandes Rodrigues, José Pedro Acioly Barbosa & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: A principal via de parto no Brasil é a cesariana, correspondendo a 57,6% em 2022, segundo o Ministério da Saúde. Há vários fatores que influenciam esta escolha, como o medo da dor e as alterações corporais. Assim, buscou-se avaliar como a preferência pela cesárea se correlaciona com a autoestima. **OBJETIVO:** Conhecer os fatores que influenciam a escolha do parto cesáreo e analisar sua relação com o índice de autoestima. **MÉTODOS:** Pesquisa de campo transversal e descritiva, feita através de questionários pelo Google Forms, com abordagem qualitativa e quantitativa. Para análise dos dados, utilizou-se a estatística simples e inferencial, estabelecendo-se o intervalo de confiança em 95%, por meio dos softwares Microsoft Excel e do IBM SPSS Statistics. A partir disso, foram coletadas médias, mínimo e máximo com desvio padrão para descrever o comportamento da amostra. **Resultados:** A pesquisa foi realizada com 155 participantes de diversos grupos sociais, majoritariamente do sexo feminino (85,8%), selecionados pelo método amostral não-probabilístico por conveniência. As idades variaram de 19 a 79 anos, com faixa etária predominante entre 19 e 31 anos (59,4%). Após isso, foram realizadas comparações e correlações por meio de testes não-paramétricos. Ao comparar os índices de autoestima entre os sexos, houve diferença significativa, assim como no teste de Kruskal-Wallis. Por fim, a partir do coeficiente de Spearman, constatou-se uma correlação negativa, fraca e altamente significativa entre os índices de autoestima e quantidade de partos. **CONCLUSÃO:** Destarte, esse estudo permitiu uma ampla visão sobre diversos fatores que influenciam na escolha do parto, em especial o cesáreo, e a forma com que se relacionam com a autoestima, com alguns dados significativos nos diferentes testes não-paramétricos. Dessa forma, mostrou a influência das diferentes variáveis categóricas em relação à autoestima.

Palavras-chave: Autoestima; Parto obstétrico; Estatística.



PRINCIPAIS IMPACTOS GERADOS PELAS LACUNAS NO ENSINO MÉDICO QUE GERAM ESTRESSE GENERALIZADO NA VIDA DOS ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DA MEDICINA

Ana Leticia de Souza Bezerra, Gabrielle Cabral Mouta, Rhawana Lorrana Oton
Guimarães, Sílvia Helena de Sousa Silva, Thalita Alves da Silva Medeiros
Nóbrega & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: O estresse compreende uma situação de tensão diante de episódios desafiadores, que geram respostas psicológicas, físicas e hormonais, com manifestações agudas ou crônicas, criando um estado de desequilíbrio do organismo. **OBJETIVO:** Conhecer o perfil social e demográfico da população-alvo, estudantes de medicina e médicos, e analisar o índice de estresse. **MÉTODOS:** Pesquisa de campo tipo descritiva, transversal e com abordagem quantitativa e qualitativa, feita através de questionários pelo Google Forms. Os dados foram analisados utilizando-se a estatística simples e inferencial, fixando-se o intervalo de confiança em 95%. A análise dos dados foi realizada através dos softwares Microsoft Excel®, versão 2019 e do IBM SPSS Statistics, versão 26. Foram coletadas médias, mínimo e máximo com desvio padrão para descrever o comportamento da amostra. Todas as análises estatísticas inferenciais foram realizadas no programa IBM SPSS Statistics, versão 26. **RESULTADOS:** A pesquisa foi realizada com 100 participantes, todos estudantes universitários de medicina ou médicos, de universidades públicas ou particulares, selecionados pelo método amostral não-probabilístico por conveniência. As idades variam de 18 a 35 anos ($M=23,93$; $DP=4,086$). Os indivíduos estavam distribuídos por faixa etária, onde 64 tinham entre 18 e 24 anos (64%), 24 variando entre 25 a 29 anos (24%) e 12 possuíam mais de 30 anos (12%). Eram predominantemente do sexo feminino com 70 representantes (70%) e 30 se apresentaram do sexo masculino (30%). Foi perguntado aos participantes quanto a suas formações acadêmicas, apresentando que 98 eram estudantes de medicina (98%) e 2 eram médicos (2%). Comparações e correlações extremamente significativas ao utilizarmos os testes não paramétricos. **CONCLUSÃO:** Esse estudo proporcionou uma ampla visão sobre diversos aspectos dos indivíduos mostrando além do perfil sócio demográfico da amostra, dados altamente significativos nos diferentes testes paramétricos. Os dados revelam a influência das diferentes variáveis categóricas em relação a nossa variável determinante estresse.

Palavras-chave: estresse; medicina; estatística; sócio demográfico.



COMPORTAMENTO SEXUAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA E SUA RELAÇÃO COM AUTOESTIMA

Lívia Palácio de Queiroz, Enedina Mayara França Alves, Gilberto Gomes Xavier
Sobrinho, Lara Maria Ferreira Lopes Valério Pinto, Mariana Alves de Sousa,
Wagner de Araújo Rodrigues & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: Autoestima é uma avaliação positiva ou negativa que uma pessoa faz de si mesma em algum grau a partir de emoções, ações, crenças, comportamentos ou qualquer outro tipo de conhecimento de si próprio. **OBJETIVO:** Analisar o comportamento sexual dos estudantes de medicina e sua relação com autoestima. **MÉTODOS:** Procedemos uma pesquisa quantitativa e qualitativa, através de questionários pelo Google Forms, do tipo descritiva e transversal. Foram utilizados dados de estatística simples e inferencial, fixando-se o intervalo de confiança em 95%. A análise dos dados será realizada através dos softwares Microsoft Excel®, versão 2019 e do IBM SPSS Statistics, versão 26. **RESULTADOS:** O estudo foi realizado com 100 participantes, selecionados pelo método amostral não-probabilístico por conveniência. As idades variaram entre 18 a 44 anos ($M = 23,33$; $DP = 4,656$), prevalecendo o sexo feminino, sendo 70 participantes (70%) e 30 do sexo masculino (30%). Perguntados se possuíam parceiros fixos, 8 acadêmicos (8,0%) nunca possuem parceiros fixos, 12 (12,0%) raramente tem, 13 (13%) às vezes possuem, 9 (9%) muitas vezes e os outros 58 participantes (58%) possuem parceiro fixo. Realizaram-se correlações e comparações por meio de testes não paramétricos, teste U de Mann-Whitney e coeficiente de Kruskal-Wallis e ao realizar o teste de correlação de variáveis a partir do coeficiente de correlação de Spearman constatou-se uma correlação negativa, fraca e altamente significativa ($\rho = -0,273^{**}$) entre o índice de autoestima e a idade, resultado que indica que maiores valores de autoestima estão associados a menores valores de idade. **CONCLUSÃO:** Evidenciou-se que o comportamento sexual entre os estudantes de medicina está diretamente correlacionado à autoestima e ao período que estão cursando, quanto mais jovens e mais recentes no curso maior a autoestima e a atividade sexual, o inverso é verdadeiro.

PALAVRAS-CHAVE: comportamento; sexual; medicina.



ATIVIDADE FÍSICA E A INFLUÊNCIA NOS NÍVEIS DE ANSIEDADE DOS ESTUDANTES DE MEDICINA

Durval de Brito Neto, Antônio Campos de Sousa Filho, Gilvani Batista de Melo Filho, Jose Batista da Motta Segundo, Polliana Faria Ramos & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: O exercício físico regular tem sido indicado como uma terapia não medicamentosa coadjuvante para o tratamento de diversos transtornos psicológicos. **OBJETIVO:** Conhecer o perfil social e demográfico da população-alvo, os estudantes de medicina e analisar o índice de autoestima. **MÉTODOS:** Pesquisa através de questionários pelo Google Forms, pesquisa de campo tipo descritiva, transversal e com abordagem quantitativa e qualitativa. Os dados foram analisados utilizando-se a estatística simples e inferencial, fixando-se o intervalo de confiança em 95%. A análise dos dados será realizada através dos softwares Microsoft Excel®, versão 2019 e do IBM SPSS Statistics, versão 26. Serão coletadas médias, mínimo e máximo com desvio padrão para descrever o comportamento da amostra. Todas as análises estatísticas inferenciais serão realizadas no programa IBM SPSS Statistics, versão 26. **RESULTADOS:** A pesquisa foi realizada com 107 participantes, todos estudantes universitários de medicina da UNIFIP, selecionados pelo método amostral não-probabilístico por conveniência. As idades variam de 18 a 25 anos ($M=20,6$; $DP=2,2$). Os indivíduos estavam distribuídos por faixa etária, onde 41 tinham entre 18 e 19 anos (38,3%), 54 variando entre 20 a 22 anos (50,5%) e 12 possuíam mais de 23 anos (11,2%). Eram predominantemente do sexo masculino com 74 representantes (69,2%) e 33 se apresentaram do sexo Feminino (30,8%). Foi perguntado aos participantes quanto ao seu estado civil, ao que responderam: 27 eram solteiros (25,2%), 47 eram casados (43,9%) e 33 divorciados (30,8). E Comparações e correlações significativas ao utilizar os testes paramétricos, dentre as quais correlações de Spearman, quanto mais horas de atividade física semanalmente menores eram os índices de ansiedade. **CONCLUSÃO:** Esse estudo proporcionou uma ampla visão sobre diversos aspectos dos indivíduos mostrando além do perfil sócio demográfico da amostra, dados altamente significativos nos diferentes testes não paramétricos. Revelar a influência das diferentes variáveis categóricas ligadas a atividade física em relação a nossa variável determinante autoestima.

PALAVRAS-CHAVE: autoestima; medicina; estatística; sócio demográfico.



CONHECER O PERFIL DO ESTUDANTE DE MEDICINA E SEUS PRINCIPAIS ENFRENTAMENTOS DIÁRIOS RELACIONADO AO ESTRESSE

Luís Eduardo Carreiro Dóia, Pedro Gomes Vieira De Oliveira, Airlla Ranny
Farias Araújo, Felipe de Andrade Moreira, Fernanda Valentim Gomes, Lidya
Hellen de Sousa Oliveira & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: Estresse é uma série de alterações no organismo humano devido a uma alteração da normalidade diária. Isso afeta os estudantes de medicina diretamente, visto que eles passam por diversas situações estressantes. **OBJETIVO:** Conhecer o enfrentamento diário dos estudantes de medicina e analisar o índice de estresse. **MÉTODOS:** Pesquisa através de questionários pelo Google Forms, pesquisa de campo tipo descritiva, transversal e com abordagem quantitativa e qualitativa. E os dados foram analisados utilizando-se a estatística simples e inferencial, fixando-se o intervalo de confiança em 95%. A análise dos dados será realizada através dos softwares Microsoft Excel®, versão 2019 e do IBM SPSS Statistics, versão 26. Serão coletadas médias, mínimo e máximo com desvio padrão para descrever o comportamento da amostra. Todas as análises estatísticas inferenciais serão realizadas no programa IBM SPSS Statistics, versão 26. **RESULTADOS:** A pesquisa foi realizada com 102 participantes em várias faculdades, selecionados pelo método amostral não-probabilístico por conveniência. As idades variam de 18 a 42 anos ($M=24,11$; $DP=5,083$). Eram predominantemente do sexo feminino com 67 representantes (65,7%) e 35 se apresentaram do sexo masculino (34,3%). Foi perguntado aos participantes qual fase do período eles afirmam ser mais estressantes, em que 22 optaram pelo começo do período (21,6%), 19 pelo meio do período (18,6%) e 33 afirmaram ser o final do período (59,9%). Ao verificar correlações Spearman constatou-se ($p= 0,349^{**}$) que maiores índices de estresse estão relacionados a maiores valores do uso de medicamentos para diminuir o estresse.

CONCLUSÃO: Esse estudo proporcionou uma ampla visão sobre os diversos aspectos das atividades dos nossos indivíduos, mostrando além do enfrentamento diário dos estudantes de medicina, apresentando dados altamente significativos em relação à variável determinante do estresse.

PALAVRAS-CHAVE: estresse; medicina; estatística; sócio demográfico.



CRENÇAS POPULARES RELACIONADAS AO USO DE ANTICONCEPCIONAL ORAL E AUTOESTIMA

Milleyse Maria Gomes Lacerda Andrade, Jefferson Gomes de Araújo, Mariana França Rodrigues, Victoria Andrade de Lima Santos, Maria Luísa Gomes Andrade & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: O anticoncepcional oral é um dos vários métodos contraceptivos disponibilizados no Brasil, sua eficácia está diretamente relacionada com a forma correta de uso e tem implicações consideráveis na autoestima da mulher. Desse modo, destacam-se ainda problemas importantes no acesso aos métodos contraceptivos especialmente nas regiões mais pobres do país, fato que se associa ao menor conhecimento, o qual se expressa especialmente por crenças populares que induzem ao menor uso dessas ferramentas. **OBJETIVO:** Analisar como as crenças populares estão relacionadas ao uso de anticoncepcional oral e suas implicações na autoestima da população em geral. **MÉTODOS:** Pesquisa através de questionários pelo Google Forms, pesquisa de campo tipo descritiva, transversal e com abordagem quantitativa e qualitativa. E os dados foram analisados utilizando-se a estatística simples e inferencial, fixando-se o intervalo de confiança em 95%. A análise dos dados será realizada através dos softwares Microsoft Excel®, versão 2019 e do IBM SPSS statistics, versão 26. Serão coletadas médias, mínimo e máximo com desvio padrão para descrever o comportamento da amostra. Todas as análises estatísticas inferenciais serão realizadas no programa IBM SPSS statistics, versão 26. **RESULTADOS:** A pesquisa foi realizada com 142 pessoas da população em geral, pelo método amostral não probabilístico por conveniência. As idades variaram entre 18 e 59 (M=26,96; DP=8,858). Eram predominantemente do sexo feminino, sendo 112 participantes (78,9%) e 30 representantes do sexo masculino (21,1%). Foram realizados achados extremamente significativos utilizando teste U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e o coeficiente de correlação de Spearman onde constatou-se uma correlação negativa, fraca e altamente significativa ($p = -0,385^{**}$) entre o índice de autoestima e a idade. Esse resultado indica que menores valores de autoestima estão associados a maiores valores de idade. **CONCLUSÃO:** Portanto, esse estudo proporciona uma ampla visão sobre os conhecimentos populares acerca dos anticoncepcionais, correlacionando a autoestima e os conhecimentos populares sobre o método. Obteve-se dados de importância nos diferentes testes não-paramétricos, demonstrando a influência das diversas variáveis categóricas correlacionadas a variável determinante da autoestima.

PALAVRAS-CHAVE: Anticoncepcional oral; Autoestima; Crenças populares.

v. 4, n. especial 1 (2023): Revista Científica Integr@ção.
(ISSN Impresso: 1809-8320)

01 A 03 DE JUNHO

2023

<https://integracao.unifip.edu.br>



PANDEMIA DO COVID-19: HÁ ASSOCIAÇÃO COM QUADROS DE AMNÉSIA?

Adhyna Jamilly de Oliveira Santos, Américo Célio Arruda Rabelo Filho, Edlúcia de Lucena Hipólito, Regina Dayana de Moraes Santos, Thauany Benjamim Maia da Cunha & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O Covid - 19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus que acomete o sistema respiratório e gerou muitas problemáticas após a sua manifestação. Atrelado a ela, notou-se o surgimento de queixas relativas a alterações neurológicas que vão desde um simples episódio de amnésia transitória global até casos mais graves como encefalopatia e acidente vascular cerebral. Assim, como o crescimento de indivíduos afetados por certas sequelas vem crescendo torna-se, então, uma questão de relevância clínica. **Objetivo:** Analisar a existência de uma relação direta entre a contaminação por Covid-19 e a amnésia. **Metodologia:** O estudo baseia-se numa Revisão Integrativa de literatura, utilizando etapas para promover uma pesquisa de qualidade, em que foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde amnésia e covid-19. A seleção dos estudos foi feita nas plataformas de bases de dados Medical Publisher, Biblioteca Virtual em Saúde e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em que foram encontrados 164 artigos, aos quais foram incluídos 17 na análise. **Resultados:** Dentre a totalidade de estudos analisados, um total de 41,16% dos indicaram haver relação direta entre a amnésia e a contaminação por Covid-19, contrapondo-se ao resultado de 23,52% que afirmaram sem relação direta e 35,28% apresentaram resultados inconclusivos. **Conclusão:** Os achados mostram a importância clínica das sequelas decorrentes do Covid-19 e a necessidade de um número maior de análises e estudos para servirem de literatura e posteriormente chegar-se a um resultado conclusivo quanto à relação do vírus com a perda de memória.

Palavras-chave: SARS-CoV-2; Vírus; Perda de memória; Sequelas.



POSSIBILIDADES TERAPÊUTICAS PARA MELHORIAS DOS SINTOMAS CLÍNICOS NA ESCLEROSE MÚLTIPLA

Mayara Rodrigues Barros da Cruz Potyguara, Lívia Carlos Fernandes de Oliveira, Raissa Azevêdo Braz, Karen Linhares de Alencar Albuquerque, Amanda Maia de Azevêdo Nóbrega, Maria Eduarda Guedes Silva & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A esclerose múltipla (EM) é a doença autoimune desmielinizante mais comum do sistema nervoso central, afetando principalmente adultos e causando impactos significativos no desempenho ocupacional e na participação social. **Objetivo:** Avaliar as principais possibilidades terapêuticas para os sintomas clínicos da esclerose múltipla. **Métodos:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura com base em dados de artigos completos disponíveis no Scientific Electronic Library Online, Medical Publisher e Biblioteca Virtual de Saúde, publicados entre 2018 e 2023. Foram selecionados 15 artigos relacionados ao tema. **Resultados:** Entre os tratamentos mais relevantes para a esclerose múltipla, destaque para o treinamento físico, a fisioterapia e a neuroreabilitação robótica, mostrando-se promissores. Pode-se utilizar também a terapia farmacológica para a terapêutica sintomática da doença e para episódios agudos. Em relação à espasticidade, dor e disfunção na bexiga provenientes da EM, foi expressiva a eficácia do canabidiol na melhora das condições se comparado com o placebo. **Conclusão:** Com base nos achados, foi possível verificar que as possibilidades terapêuticas para o agravo não possuem caráter curativo, mas proporcionam efeitos positivos na vida dos pacientes. Recomenda-se a realização de novos estudos mais aprofundados, abordando uma estratégia de tratamento multidisciplinar e o uso de novas tecnologias, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Esclerose Múltipla; Terapêutica; Qualidade de vida.



EXPOSIÇÃO DIGITAL ÀS TELAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Yan Carlos de Sousa Diniz, Emmanuelle Campos Diniz Rafael, João Pedro
Paulo de Andrade, Lívia Araújo Sousa & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: As tecnologias estão intimamente presentes na vida das pessoas, com a exposição digital às telas inserida durante os primeiros anos de vida dos filhos. A ação tecnológica nessa faixa etária pode promover uma variedade de efeitos biopsicofisiológicos deletérios no desenvolvimento infantil. Dessa forma, é imprescindível a análise da comunidade científica sobre a temática, a fim de mitigar esses efeitos nas próximas gerações. **Objetivo:** Evidenciar a relação entre tempo de tela e as consequências para o desenvolvimento infantil. **Método:** Foi realizado um estudo na forma de Revisão Integrativa de Literatura. A coleta de dados foi feita nas plataformas de pesquisa nacionais e internacionais. Os Descritores em Ciências da Saúde utilizados foram: “tempo de tela”, criança e “desenvolvimento infantil”. Foram encontrados 4558 artigos, dos quais 16 artigos foram selecionados. **Resultados:** A maioria dos artigos foi catalogada como revisão sistemática (n=6; 37,5%). Ademais, há maior predominância dos Estados Unidos da América como país de origem das pesquisas, do inglês como o idioma principal e dos anos de 2022 (n=5; 31,2%) e 2020 (n=4; 25%) como períodos mais expressivos. Em relação aos impactos observados no desenvolvimento infantil, notou-se como maior prevalência os efeitos fisiológicos, com 56,3% (n=9). Evidenciando-se, também, repercussões no âmbito do estilo de vida, de ordem motora, visual e cardiovascular, além de transtornos neurológicos. **Conclusão:** Portanto, identificou-se a utilização predominante de telas por indivíduos na fase infantil de maneira exacerbada, ultrapassando o limiar estabelecido para cada faixa etária, promovendo consequências negativas nesse período.

Palavras-chave: Tecnologia; Cognição; Efeitos psicofisiológicos.

TERAPIAS COMPLEMENTARES PARA O TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE

Alan Davyd Almeida Leandro, Alberto Hafid Dantas Assis, Fernando Cezar Souza Santos Filho, Luiz Francisco da Silva Neto, Nadson Lopes Nunes, Poliana da Costa Oliveira & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é a condição neuropsiquiátrica mais comum na infância; deve ser foco de inclusão educacional, tendo base legal, em que estratégias pedagógicas diferenciadas são necessárias. Nessa perspectiva, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) têm um papel importante, pois suas intervenções têm como objetivo a prevenção de doenças no corpo, na mente e a melhoria da qualidade de vida. Desse modo, o estudo teve como objetivo analisar a relevância e eficácia das PICS utilizadas no tratamento de pacientes com TDAH. Uma revisão integrativa foi realizada com triagem de 14 estudos selecionados em três bases de dados. Foram excluídos os trabalhos que não respondiam a questão de pesquisa além das duplicidades. Dentre as terapias estudadas, as mais citadas foram fitoterapia, musicoterapia e meditação, as quais apresentaram resultados positivos em todas as literaturas consultadas. Assim, percebe-se que apesar das PICS trazerem muitos benefícios, ainda se faz necessário mais pesquisas específicas sobre as terapias complementares para o tratamento de TDAH, pois embora o acervo bibliográfico sobre o referido tema seja extenso, ao objeto de estudo da revisão se tornou limitado. Logo, as potencialidades e fragilidades citadas nos estudos merecem mais atenção por parte da academia e dos gestores.

Palavras-chave: Terapêutica; Fitoterapia; Musicoterapia.



VIABILIDADE DA CANNABIS NO TRATAMENTO DE ALZHEIMER

Hallysson André de Oliveira Medeiros, Ana Luiza de Sousa Oliveira, Caio Lustosa Trindade & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: Pelo menos 50 milhões de pessoas possuem algum tipo de demência. Idade, genética, doenças cardiovasculares e traumatismo craniano são fatores de risco para o seu desenvolvimento. Visto o aumento dos casos de demência do tipo Alzheimer, a utilização de substâncias como a Cannabis para o tratamento da patologia torna-se cada vez mais discutida no âmbito médico, surgindo como terapia inovadora. **Objetivo:** Compreender a viabilidade da utilização da cannabis como tratamento inovador para a Doença de Alzheimer. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, triados estudos dos bancos de dados da Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde e Biblioteca nacional de medicina dos Estados Unidos, seguindo os critérios de exclusão e inclusão determinado, em que foram selecionados 26 artigos, para compor a amostragem final. **Resultados:** A maior parte dos estudos mostrou que a Cannabis é efetiva até certo ponto no tratamento de sintomas associados, porém, há necessidade de mais estudos para entender melhor a ação da planta e seus possíveis efeitos colaterais (80,7%). **Conclusão:** Os dados mostram a efetividade da cannabis como uma substância inovadora para o tratamento do Alzheimer, porém ainda são necessárias mais pesquisas para esclarecer os benefícios e malefícios no seu uso, além de sua segurança.

Palavras-chave: Terapêutica; mal de Alzheimer; Demência do tipo Alzheimer; Canabidiol.



USO TERAPÊUTICO DA TOXINA BOTULÍNICA NO TRATAMENTO DA ENXAQUECA

Romero Alves de Lima Segundo, Maria Isabelly Araújo Ferreira, Arthur Sarmiento Sales, Melânia Mayra Pereira Queiroga, Arthur Alves Alencar & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

A presente revisão integrativa da literatura teve o objetivo de identificar as implicações e benefícios do uso da toxina botulínica tipo A como alternativa ao tratamento da enxaqueca, espécie muito incidente entre as dores crônicas. Na execução do presente estudo, foram seguidas seis etapas, utilizando-se os Descritores em Ciências da Saúde combinados da seguinte forma <<"Toxina Botulínica Tipo A" AND "Transtornos de Enxaqueca" AND "Dor Crônica" AND "Uso terapêutico">>. Foram fundamentais as bases de dados Medical Publisher, Scientific Electronic Library Online e a Biblioteca Virtual em Saúde. Realizou-se uma seleção de estudos de acordo com filtros relacionados aos idiomas português e inglês, autores, título, periódico, tipo de estudo e principais resultados dos trabalhos publicados no período compreendido entre os anos de 2018 e 2023, selecionando-se dentre estes, 18 artigos obtidos a partir da triagem realizada e que responderam à questão norteadora. Diante dos artigos selecionados foi percebido que a toxina botulínica tipo A encontra resultados positivos para o tratamento da enxaqueca, destacando-se dentre as demais terapias medicamentosas prescritas para o agravo pela sua segurança, eficácia, melhoria da qualidade de vida, redução da utilização de recursos de saúde, especialmente serviços de emergência e outras terapias medicamentosas e diminuição do comprometimento no trabalho para os pacientes que sofrem com a referida enfermidade.

Palavras-chave: Toxina botulínica tipo A; Usos terapêuticos; Transtornos de enxaqueca; Dor crônica.



A INFLUÊNCIA DO IODO NO QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA

Ramon Pereira Martins, Ingrid Dantas Rodrigues, Larissa Pinheiro de Araújo,
Jordânia Letícia Ferreira de Oliveira, Karolaynny Alencar Diniz, Luciana Clédina
Bezerra Lopes, Wanderson Gabriel de Brito Limeira
& Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: Por ser o iodo um micronutriente essencial para o desenvolvimento cerebral humano e animal, a deficiência desse micronutriente pode estar associada a grandes prejuízos mentais, como por exemplo, à influência negativa sob o Quociente de Inteligência (QI). **Objetivos:** Associar a suplementação nutricional de iodo durante a gestação com o aumento no teste psicológico da definição do QI. **Métodos:** A revisão foi realizada por meio da busca de estudos sobre o tema realizados nos últimos 10 anos (2013-2023). Foram encontrados 225 artigos que abordavam a temática e, dentre estes, 24 artigos internacionais foram selecionados, organizados, discutidos e sintetizados. **Resultados:** Ao fim do processo, constatou-se que o maior percentual dos estudos (75,00%) indica que a suplementação do iodo tem interferência no QI. **Conclusão:** Este estudo forneceu uma visão geral dos aspectos associados a taxa de suplementação do iodo na população em relação ao possível aumento do desenvolvimento cognitivo. Porém, nota-se que os dados apontados foram inconclusivos em boa parte dos estudos, sendo, portanto, necessárias novas investigações a fim de correlacionar a efetividade desse micronutriente no corpo humano com suas habilidades e atividades intelectuais.

Palavras-chave: Micronutriente; QI; Suplementação Nutricional.



CUIDADO AOS FUMANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE BRASILEIRA

Héric Kayuan Henrique Barros, Hemerson H. Lustosa Silva, Davi Alves Araújo,
Neusa Moreira de Carvalho & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A abordagem do tabagismo na Atenção Primária à Saúde pode ser individual ou em grupo, breve ou básica e é mas é complexa devido à dependência física e emocional **Objetivo:** Analisar as estratégias utilizadas pela Atenção Básica no Brasil para lidar com o tabagismo, bem como as opções de abordagem de intervenção utilizados pelos profissionais de saúde nesse contexto. **Metodologia:** Estudo de revisão integrativa, que envolve a união de diferentes metodologias em diferentes bancos de dados United States National Library of Medicine, Scientific Electronic Library Online e Biblioteca Virtual em Saúde. A pesquisa teve como questão de pesquisa "Como a Atenção Primária à Saúde brasileira tem cuidado do usuário tabagista?". Os critérios de inclusão relação com o tema, artigos de acesso livre em português ou inglês publicados entre 2012 e 2022 e critérios de exclusão evitar repetições e que não contribuíram ao tema. **Resultados:** Verificou-se entre os facilitadores de adesão ao vício que a maioria estava relacionada a fatores como o consumo de álcool e outras drogas, e transtornos mentais. Em relação à abordagem da APS, verificou-se que 52,25% dos casos utilizavam terapia cognitivo-comportamental e 31,25% adotavam uma abordagem por equipe multiprofissional. Quanto ao tipo de intervenção, em 25% dos casos foi adotada a intervenção breve e 12,5% como básica. **Conclusão:** A abordagem para lidar com o tabagismo na Atenção Básica deve considerar comorbidades, econômicos e aspectos sociais. A implementação de estratégias individualizadas ou em grupo específico proporciona uma intervenção mais eficaz, educativa e terapêutica. Capacitar os profissionais de saúde, incluir rede de atendimento e a família e priorizar ações de educação em saúde.

Palavras-chave: Fumantes; Atenção primária; Programa Nacional de controle ao Tabagismo.



RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COMO ALTERNATIVA NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE PARKINSON

Flávia Alessandra de Andrade Ferreira, Kamilla Paulino Santos, Maria Luiza Rodrigues Dantas, Tauany Costa da Silva, Vanessa Almeida Ferreira & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A doença de Parkinson é um distúrbio heterogêneo com sintomas motores e não motores. Destaca-se como uma das doenças neurodegenerativas mais comuns, com diagnóstico iminentemente clínico. A ressonância magnética convencional é o principal tipo de neuroimagem que auxilia no diagnóstico precoce e diferencial da doença de Parkinson. **Objetivos:** fornecer uma visão abrangente sobre o papel da ressonância magnética (RM) na doença de Parkinson (DP), destacar a importância da RM como uma ferramenta diagnóstica e de monitoramento da progressão da doença e destacar os avanços recentes no uso dessa neuroimagem com o intuito de obter maiores conhecimentos sobre os mecanismos subjacentes à Doença de Parkinson. **Métodos:** Nessa revisão integrativa realizamos a coleta de produções científicas relacionadas ao uso da ressonância magnética nuclear no diagnóstico e diferenciação de doenças neurodegenerativas. **Resultados:** sugerem que a ressonância magnética (RM) pode ser uma ferramenta útil para o diagnóstico da doença de Parkinson. Vários estudos foram encontrados que relatam diferenças estruturais e funcionais na RM entre pacientes com a doença de Parkinson e controles saudáveis, incluindo alterações no volume e na conectividade de várias regiões cerebrais. Além disso, a RM pode ajudar a diferenciar a doença de Parkinson de outras doenças com sintomas semelhantes, como a atrofia de múltiplos sistemas. No entanto, também foram encontradas algumas limitações e desafios associados ao uso da RM na doença de Parkinson, como a variabilidade nos protocolos de imagem e as dificuldades em interpretar os resultados. Portanto, embora a RM pareça promissora como uma ferramenta de diagnóstico para a doença de Parkinson, mais pesquisas são necessárias para validar sua utilidade clínica e superar as limitações encontradas. **Conclusão:** Portanto, apesar do diagnóstico da doença de Parkinson continuar sendo clínico o surgimento de técnicas de neuroimagem sobretudo a ressonância magnética promete maior precisão diagnóstica.

Palavras-chave: Doenças Neurodegenerativas; Neuroimagem; Diagnóstico Diferencial.



TREINAMENTO RESISTIDO E EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO MUSCULAR NO MANEJO DA FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Camila de Oliveira Prata Pessoa, Nayra Delany de Amorim Alves, Paula Karina
Gomes da Silva Alves, Paulo Henrique Santos Nascimento, Thyalle Laís Gois
de Rezende & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A fibromialgia é a terceira condição musculoesquelética mais frequente, e sua prevalência aumenta com a idade. É caracterizada por dor crônica generalizada, fadiga, distúrbios do sono e sintomas funcionais. Seus critérios diagnósticos e classificatórios ainda estão em discussão e, consequentemente, as estratégias para seu o tratamento. **Objetivo:** compreender a influência do treinamento resistido e dos exercícios de alongamento muscular no tratamento do paciente fibromiálgico. **Métodos:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura a qual norteou-se pela seguinte pergunta: “Em pacientes com fibromialgia, o treinamento resistido comparado aos exercícios de alongamento muscular é melhor para o tratamento?” A amostra de artigos foi obtida a partir de uma busca nas seguintes bases de dados: U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM – PUBMED), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e na Base de Dados em Enfermagem (BDENF) resultando numa amostra final de 07 trabalhos científicos compreendidos nos últimos 10 anos. **Resultados:** Percebeu-se que o exercício de alongamento foi a modalidade melhor aceita e tolerada pelos pacientes fibromiálgicos, visto que atua de forma benéfica na atenuação da dor difusa, sintoma esse que mais prevalece na fibromialgia. Logo, evidencia-se que a prática física oferece melhora no tratamento, sendo os exercícios de alongamentos mais efetivos para promoção da qualidade de vida dos pacientes no que se refere a dor e a limitação das atividades cotidianas enquanto o exercício resistido atua diretamente na melhora do quadro ansioso e depressivo desses indivíduos. **Conclusão:** Faz-se necessário mais estudos e pesquisas acerca da temática com o intuito de oferecer novas informações sobre a influência do exercício resistido e do exercício de alongamento no tratamento da fibromialgia.

Palavras-chave: Fibromialgia; Exercício físico; Tratamento.



USO DE IMUNOBIOLOGICOS EM COMPARAÇÃO AO DE CORTICÓIDES NO TRATAMENTO DA ARTRITE PSORIÁSICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Lucas Lucena Lima, Amanda Luah de Medeiros Ribeiro, Marília Miranda
Santana, Paloma Monique Santos, Sarah Melo Alencar, Tammi Raisla Rocha
Gaspar & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A artrite psoriásica é uma doença musculoesquelética crônica imunomediada, cuja principal característica é a progressão para anquilose por ossificação secundária de lesões inflamatórias, com incapacidade progressiva e impacto significativo na qualidade de vida, o que requer tratamento em longo prazo. **Objetivo:** Avaliar se o uso de imunobiológicos, em relação ao de corticoides, proporciona um melhor prognóstico no tratamento de pacientes com artrite psoriásica. **Metodologia:** Realizou-se uma Revisão Sistemática de Intervenção, utilizando-se as bases Biblioteca Virtual em Saúde, Published Med, Periodics Capes, Scopus, Cochrane e Sciencedirect, as palavras-chaves "Arthritis, Psoriatic", "Adrenal Cortex Hormones", "Biological Products" e seus respectivos sinônimos, entre os anos 2013 e 2023, em todos os idiomas. A seleção dos estudos a partir de pré-requisitos proporcionou uma amostra de cinco artigos, cujos dados foram extraídos para compor os resultados da presente RS. **Resultados:** Notou-se que a parcela dos estudos que argumenta sobre a corticoterapia mostra repercussões positivas na melhora clínica da dor, especialmente na redução da inflamação axial em pacientes com artrite psoriásica, enquanto que a terapia com imunobiológicos, além proporcionar a melhora clínica destes indivíduos, também resulta na redução da atividade da doença. **Conclusão:** Maiores impactos positivos foram obtidos com a terapia imunobiológica na qualidade de vida dos portadores de artrite psoriásica, no entanto, mais estudos devem ser realizados com o intuito de esclarecer a segurança e os efeitos adversos do uso a longo prazo desses medicamentos.

Palavras-chave: Artrite; Terapia com Imunobiológicos; Segurança.



EFICÁCIA DA NEUROMODULAÇÃO NO TRATAMENTO DA ENXAQUECA CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Ana Beatriz Vieira Sousa, Raynne Maia Cunha, Carolina Pedrosa Batista,
Rayanne Maia Cunha, Ana Júlia de Almeida Fernandes
& Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: As técnicas de neuromodulação no tratamento da enxaqueca crônica estão sendo bastante discutidas, visto que os tratamentos convencionais apresentam baixos índices de efetividade. Apesar de existirem inúmeras terapêuticas para a enxaqueca, sendo baseados em prevenção e sintomáticos, como anti-inflamatórios e triptanos, essas alternativas apresentam efeitos colaterais indesejados, são mal toleradas e não são responsivas. Nesse contexto, a neuromodulação está sendo relatada na literatura como eficaz para dores de cabeça. **Objetivo:** Avaliar a eficácia da neuromodulação no tratamento da enxaqueca crônica. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, que teve como pergunta norteadora “Em pacientes com enxaqueca crônica, a neuromodulação em comparação com o placebo colabora para o alívio dos sintomas?”. Os artigos selecionados foram extraídos das seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National Library of Medicine (PUBMED), Scientific Electronic Library Online (Scielo), ScienceDirect e Cochrane Library. Como critérios de elegibilidade, foram escolhidos ensaios clínicos randomizados com idioma inglês, português e espanhol, dos últimos 10 anos e em texto completo disponível, sendo a amostra final de 11 artigos. **Resultados:** Quanto aos resultados alcançados, observa-se redução significativa da dor na enxaqueca crônica com o uso do dispositivo de neuromodulação, como a estimulação nervosa periférica dos nervos occipitais, a qual revelou eficácia de 12 meses na redução dos sintomas. Ademais, a incidência de eventos adversos relacionados ao dispositivo foi baixa. **Conclusão:** A neuromodulação tem se mostrado como uma alternativa para o tratamento da enxaqueca crônica, provocando resultados indubitavelmente positivos entre os pacientes, em especial àqueles que não respondem de forma eficiente aos fármacos e tratamentos convencionais.

Palavras-chave: Terapia de Neuromodulação Percutânea; Síndromes de Enxaqueca; Eficácia Clínica.



USO DO CANABIDIOL COMO COADJUVANTE VERSUS O NÃO USO EM CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Monalisa Maria de Souza Fernandes Paulo, Luiz Henrique Celestino Camboim
Sousa, Giovanna Kailany Machado de Oliveira Moura, Denis Mateus dos
Santos Penha, Antônio Reney Beserra de Araújo, Francisco de Assis Remígio III
& Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: As terapias coadjuvantes, como o uso do canabidiol, vêm se mostrando de grande valia no tratamento de pessoas em cuidados paliativos, haja vista a ineficácia de outros tipos de recursos terapêuticos na promoção do bem-estar desses indivíduos. **Objetivo:** Comparar o efeito do uso do Cannabis como tratamento coadjuvante versus o não uso nos pacientes em cuidados paliativos. **Metodologia:** Realizou-se uma Revisão Sistemática de Intervenção, na qual, inicialmente, foi estruturado o acrônimo PICO e sua questão de pesquisa. Após isso, foi realizada uma busca nas principais bases de dados através dos Descritores em Ciências da Saúde que melhor se relacionaram ao tema abordado. Para a concretização da pesquisa, foi feita uma triagem dos dados utilizando o aplicativo de revisão Rayyan, para que, por fim, fossem selecionados os seis artigos que serviram de base para a construção do presente estudo. **Resultados:** Em 66,6% dos estudos analisados, que buscaram avaliar o uso medicinal do canabidiol, foi evidenciado que a utilização desse composto e dos seus derivados no tratamento antálgico teve como impacto uma melhora significativa da dor, da limitação física e de outros sintomas, além do controle das doenças abordadas nas pesquisas. **Conclusão:** O uso do canabidiol como terapia coadjuvante mostrou-se muito benéfico, visto que aumentou de forma significativa o bem-estar dos pacientes por ser capaz de atenuar diversos sintomas, principalmente a dor.

Palavras-chave: Cannabis; Qualidade de Vida; Terapias Alternativas.



ANTIDEPRESSIVOS E PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM PACIENTES PORTADORES DA FIBROMIALGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA

Sarah Hemmyly Honorato Saraiva, Lara Correia Aires, Lavínia Abrantes Formiga, Ohara Nayanne Nunes Pereira Inácio de Queiroz, Francisco Galdino Dantas Neto, Maria Júlia de Oliveira Fialho
& Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Comparar, na fibromialgia, a eficácia do tratamento com antidepressivos em comparação a prática de exercício físico. **Método:** Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, cuja questão norteadora é “em pacientes com fibromialgia, a prática de exercícios físicos, em comparação a eficiência do uso de fármacos antidepressivos, melhora a sintomatologia algica?”. Para o desenvolvimento do estudo, utilizou-se as seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Publisher (PubMed), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) e Science Citation Index (SciSearch), seguida da aplicação dos critérios de elegibilidade, considerando textos completos em inglês, português e ensaio clínico randomizado. Em seguida, foram selecionados os artigos pelo título, resumo e metodologia, totalizando, ao final, cinco artigos. **Resultados:** Observa-se que os exercícios físicos, tais como alongamento e aeróbico, no tratamento da fibromialgia, mostraram-se eficazes em relação a sintomas como depressão, sono, ansiedade e dor comparado a outras atividades físicas. Em relação aos fármacos antidepressivos, notou-se que a fluoxetina em monoterapia não reduziu completamente os sintomas algicos. Assim, vê-se que o principal tratamento para FM é não farmacológico por meio dos exercícios aeróbicos. **Conclusão:** Após a análise do estudo, evidencia-se que tratamento da fibromialgia deve ser baseado em uma abordagem multidisciplinar aliando exercícios físicos e tratamento medicamentoso, já que o uso de antidepressivos de forma isolado como única opção terapêutica não tem mostrado maior eficácia comparado às atividades físicas.

Palavras-chave: Síndrome Dolorosa; Fluoxetina; Alongamento Muscular.



ARTRITE REUMATOIDE VERSUS FREQUÊNCIA DE LINFOMA NÃO HODGKIN: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Vitória Letícia Lima de Andrade, Marisley Layrtha Santos, Eduarda Valadares
Ribeiro Caetano, Maria Theresa Lima Luis, Anésio de Medeiros Queiroz
Bisneto, Matheus Adriani Caitano Cavalcante & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune crônica que afeta as articulações e pode levar a quadros clínicos com deformidades permanentes e incapacidade funcional. Embora o tratamento da AR tenha melhorado consideravelmente nos últimos anos, sua associação com o linfoma não Hodgkin (LNH) ainda é objeto de debate. **Objetivo:** Analisar a literatura atual sobre a associação entre AR e LNH. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma busca sistemática na literatura, incluindo estudos observacionais (coorte, caso-controle e transversais). Os artigos selecionados foram extraídos das seguintes bases de dados: PubMed, Web of Science, Embase, Scopus, LILACS, Cochrane e Google Scholar. Como critérios de elegibilidade, foram escolhidos estudos observacionais, com população que envolvia pessoas com artrite reumatoide e linfoma não Hodgkin, sem restrição de idioma ou data e com texto completo disponível, sendo a amostra final de oito artigos. **Resultados:** Quanto aos resultados alcançados, observou-se que a relação entre artrite reumatoide e linfoma não Hodgkin tem sido estudada por muitos anos e existem evidências de que pacientes com AR têm um risco aumentado de desenvolver LNH. **Conclusão:** Dessa forma, é necessário monitorar os pacientes com AR, bem como orientar quanto a sinais e sintomas de LNH, como linfonodos aumentados, sudorese noturna, perda de peso inexplicável e fadiga persistente.

Palavras-chave: Doenças Autoimunes; Neoplasias; Linfoma.



SEQUELAS MÚSCULOS ESQUELÉTICAS EM PACIENTES ADULTOS JOVENS E IDOSOS QUE TIVERAM INFECÇÃO PELO COVID-19

Claudio Vieira da Luz Filho, Hádley Martins Macedo, Keveen Ranylo Batista
Lacerda, Leonardo da Silva Gonçalves, Matheus Soares Mota
& Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: O objetivo deste estudo é identificar quais sintomas músculo esqueléticos são mais prevalentes em manifestações após a doença Covid-19. Trata-se de uma revisão sistemática de estudos publicados, sem restrição de idioma, no recorte de tempo entre 2019, período em que desencadeou a pandemia mundial do novo coronavírus - o Sars-cov-19 - até o início do ano de 2022, tendo como foco indivíduos maiores de 18 anos. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática, onde as publicações foram retiradas das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Medical Publisher (PubMed), Brasil Scientific Electronic Library Online (Scielo), National Library of Medicine (Medline), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), com as seguintes palavras-chave= "COVID-19" AND "skeletal muscle" AND "sequels" AND "treatment" AND "old" AND "young" **Resultados:** Dos 50 registros identificados, 33 foram selecionados por título e resumo. Desses, 17 artigos foram excluídos. Após leitura completa dos artigos, foram descartados mais 6, permanecendo os 10 artigos que foram incluídos nesta revisão sistemática, os quais apresentaram como principais manifestações musculoesqueléticas os de sintomas de fadiga, seguida de mialgia e dores articulares. Além disso, apresentar doenças crônicas prévia e maior tempo de internação hospitalar foram fatores associados com maior risco para adquirir a síndrome pós-covid. Os estudos presentes mostram que 78% dos pacientes que contraíram a doença covid- 19 seguem com sintomatologia por, no mínimo 90 dias. **Conclusão.** As manifestações musculoesqueléticas provocadas pelo covid são diversas. Contudo, dada novidade da cepa e da falta de esclarecimento da extensão de sua ação inflamatória sobre o corpo, há necessidade de mais estudos e de avaliação a longo prazo destas manifestações, para que, dessa forma, seja possível conhecer o curso dos sintomas e ter conhecimento suficiente para guiar um tratamento com uma maior eficácia.

Palavras-chave: Sintomas, Musculoesqueléticas, COVID-19, Pós- covid.



USO DO ÁCIDO FÓLICO NO FECHAMENTO DO TUBO NEURAL NO PRIMEIRO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Thais Helena Gomes de Sousa, Ana Luiza Silva de Araújo Lucena e Sousa, Germana Fernandes Constantino, Layssa Machado Alves, Nicole Joane Pereira e Silva & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A suplementação de ácido fólico na gestação, principalmente no primeiro trimestre, é indispensável para a prevenção de defeitos congênitos no tubo neural e para um saudável desenvolvimento da criança. Sabe-se que há redução dos casos de anencefalia, paralisia dos membros inferiores, retardo mental, dificuldades de aprendizagem escolar e incontinência urinária e intestinal em bebês quando as mães usam corretamente essa vitamina. **Objetivo:** Avaliar a influência do uso do ácido fólico no fechamento do tubo neural no primeiro trimestre da gestação e os fatores associados. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, que teve como pergunta norteadora “Em gestantes com até 12 semanas, a suplementação de ácido fólico diminui a incidência de alterações no fechamento do tubo neural do RN?”. Os artigos selecionados foram extraídos das seguintes bases de dados: U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM – PUBMED), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud LIS (IBECS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Cochrane e Web of Science. Como critérios de elegibilidade, foram escolhidos ensaios clínicos randomizados nos idiomas inglês ou português, dos últimos 10 anos, permanecendo 09 artigos. **Resultados:** Observou-se que apesar do efeito benéfico nos recém-nascidos do uso de ácido fólico no início da gestação, ainda não temos uma baixa adesão da população feminina à suplementação em até 12 semanas. **Conclusão:** são necessárias estratégias para incentivar o consumo de ácido fólico no primeiro trimestre de gestação. Ainda, devem-se utilizar esses esforços para realizar mais pesquisas sobre a temática, esclarecer novas informações que façam acompanhamento em serviços públicos ou privados, com a finalidade de evitar possíveis complicações neurais ao feto.

Palavras-chave: Ácido Fólico; Gravidez; Tubo neural.



EFICÁCIA DO CANABIDIOL EM DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Alisson Fernandes Lobo Maia, Giovana Leite Cavalcanti Olímpio, Heloísa Vidal
Belo Maia, Juliana Gil Dantas Marques da Rocha, Kalliane Kelly De Almeida
Queiroz Falcão & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A cannabis sativa pode ser utilizada também como extratos e óleos, demonstrando efeitos considerados positivos em várias situações clínicas, tendo indicação para algumas doenças neurodegenerativas (DN), as quais se referem a diversos distúrbios decorrentes, geralmente, da deterioração neuronal progressiva específica e causam prejuízos severos na qualidade de vida dos pacientes, acometendo partes do seu corpo e limitando sua autonomia gradativamente, de forma irreversível e sem prognóstico de cura. **Objetivo:** Analisar se o uso de canabidiol representa um tratamento alternativo eficaz para doenças neurodegenerativas. **Metodologia:** Revisão sistemática da literatura, com busca de materiais nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Electronic Library Online, Google Acadêmico, Legislação Básica de Saúde da América Latina e Caribe e Base Bibliográfica em História da Saúde Pública na América Latina e Caribe, a partir da combinação dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde: doenças neurodegenerativas (neurodegenerative diseases), canabidiol (cannabidiol) e eficácia clínica (clinical efficacy). **Resultados:** Percebeu-se grande escassez de pesquisas sobre o tema, sendo selecionado, no universo encontrado, quatro artigos para referência da discussão sobre o tema. A partir da análise, verificou-se que a literatura considera o uso do canabidiol como estratégia alternativa de potencial eficácia para o tratamento de DN, com efeitos já relatados em algumas pesquisas. No entanto, é necessário o desenvolvimento de mais investigações, que possam esclarecer aspectos ainda pouco conhecidos e administração médica da substância. **Conclusão:** O canabidiol possui relevante efeito terapêutico nos tratamentos de doenças neurodegenerativas, principalmente em razão dos seus efeitos anti-inflamatório, neuroprotetor e com efeitos colaterais considerados leves, quando comparados aos causados por outros medicamentos.

Palavras-chave: Doenças neurodegenerativas. Canabidiol. Eficácia Clínica.



ANÁLISE DA COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS NA MESORREGIÃO DO SERTÃO PARAIBANO

Ana Flávia Medeiros, Alana Dias Alves, Ellen Karyne de Souza Santana
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A cobertura vacinal de crianças tem sido um indicador de grande relevância para a avaliação das condições e qualidade da atenção à saúde nas diferentes regiões do Brasil. Desse modo, aspira-se entender as principais evidências da cobertura vacinal e as ações sociopolíticas necessárias para sanar os obstáculos associados as metas de imunização infantil. **Objetivo:** Realizar uma análise da cobertura vacinal de crianças na mesorregião do sertão paraibano. **Método:** Evidencia-se um estudo documental e quantitativo voltado para a interpretação de dados coletados através do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância (PQA-VS), organizados por meio do Microsoft Excel®. **Resultados:** Percebe-se que as metas nesses municípios não foram alcançadas ou atingiram índices baixos, em sua maioria. Nesse sentido, observa-se a existência de possíveis negligências do sistema de saúde e também da população em geral, visto que, no que se refere a um fornecimento de estratégias, informações e planejamento acerca do assunto, pode-se inferir que houve alguma falha, dado que as metas vacinais propostas não foram atingidas. **Conclusão:** A baixa cobertura vacinal reflete a influência das barreiras de acesso à vacinação, tornando importante e necessário que haja uma facilitação na obtenção das doses de vacina, na ampliação do horário de atendimento e na busca ativa de crianças com vacina em atraso.

Palavras-chave: Criança; Cobertura vacinal; Vacina.



HANSENÍASE E SEUS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS NA REGIÃO DO CARIRI NO CEARÁ DO ANO DE 2021 A 2023

Isadora Ferraz de Queiroga Freire, Gabriel Carlos Carvalho Pinheiro, Emilly
Laianny Quirino de Lima, Maria Eduarda Silva de Sousa
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A hanseníase chegou à região do Cariri, no Ceará, durante o processo de colonização. Ao longo dos séculos, a doença teve um impacto significativo na saúde e nas comunidades locais, em que pessoas foram isoladas do convívio social. Atualmente, o Ceará adota políticas de saúde para o diagnóstico precoce, tratamento adequado e reintegração social dos pacientes com hanseníase. **Objetivo:** Compreender os aspectos epidemiológicos e sociais que envolvem a hanseníase na região do Cariri, no estado do Ceará no ano de 2021 a 2023. **Método:** Foi realizado um estudo documental com dados secundários a partir de uma análise de indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – PQA – VS com enfoque em uma abordagem quantitativa para análise dos indicadores e seus resultados. **Resultados:** Pode-se observar que, no ano de 2021, seis cidades, e no ano de 2022, doze cidades não apresentaram diagnósticos da doença, fixando em 0% o resultado do indicador. Já em 2021, quinze cidades, e em 2022, dezesseis cidades, atingiram a meta, fixando seu valor entre 80% e 100% em relação aos contatos examinados de novos casos. **Conclusão:** Evidencia-se, portanto, que a Hanseníase continua sendo um desafio para a saúde pública nos municípios da região do Cariri no Estado do Ceará. A prevalência alarmante de casos em grupos sociais minoritários indica a necessidade de uma atenção contínua e efetiva por parte das autoridades de saúde, necessitando de políticas de saúde inclusivas, a fim de alcançar uma detecção precoce, tratamento adequado e prevenção da doença.

Palavras-chave: Aspectos Epidemiológicos; Cariri; Hanseníase.

ANÁLISE COMPARATIVA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE DO SERTÃO PARAIBANO

Raoni de Araújo Pegado, Denise Candeia de Lima, Maria Clara Alves de
França Dantas, Myrellia Samylle Laurinda de Araújo, Rafaely Sabrina Oliveira
de Sousa & Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: As ações de vigilância em saúde nos diferentes territórios apresentam indicadores importantes para mensurar o impacto da saúde pública e consequentemente as condições de saúde de cada usuário do Sistema Único de Saúde. **Objetivo:** Realizar uma análise comparativa de ações de vigilância em saúde nas Gerências Regionais de Saúde do sertão paraibano. **Método:** Realizou-se uma pesquisa documental dos resultados apresentados pelo Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) no ano de 2021. Com base nas informações, foram plotados gráficos ilustrando o perfil da macrorregião, como também de cada Gerência de Saúde. **Resultados:** A partir da análise dos indicadores, pôde-se constatar que a macrorregião obteve um baixo desempenho, com 48% dos municípios atingindo a meta do programa. Com relação às Gerências de Saúde, os melhores resultados foram obtidos pelas 7ª, 8ª e 11ª Gerências, enquanto que a 6ª e 9ª Regionais apresentaram níveis inferiores, quando comparados com as demais. **Conclusão:** Pode-se inferir a existência de uma série de fatores que influenciam na qualidade dos indicadores das ações de vigilância, e que geram, por consequência, prejuízos à oferta dos serviços de saúde.

Palavras-chave: Indicadores de saúde; Sertão paraibano; Vigilância em saúde.



O IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NA ADESÃO AOS TESTES DE HIV DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI - CRAJUBAR/CE

Ana Clara Melo de Medeiros, Davi Ribeiro Dantas Luiz, Fellype William Sobreira Dias, Karem Gabrielle Penha Carvalho, Milleny Vitória Nunes de Araújo & Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A pandemia do COVID-19 afetou a área da saúde, pois a atenção voltou-se aos problemas causados pela doença em detrimento de outros serviços. A adesão aos testes de HIV, exame oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, é fundamental para avaliar os principais locais infectados. A região do CRAJUBAR, no estado do Ceará – Brasil, por sua densidade populacional sofreu repercussões durante a pandemia, sobretudo na realização de testes de HIV, o que evidencia os prejuízos nos diagnósticos. **Objetivo:** Identificar o impacto da pandemia Covid-19 na adesão aos testes de HIV da região metropolitana do Cariri, Crajubar, estado do Ceará – Brasil. **Método:** Realizou-se um estudo documental com o resultado dos indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), um programa do Ministério da Saúde – Brasil. **Resultados:** Em 2020, houve decréscimo do número de testes em relação a 2019 para Barbalha e Juazeiro do Norte, enquanto que para Crato houve aumento. Já em 2021, durante maior controle da situação do vírus, as cidades Barbalha e Juazeiro do Norte conseguiram elevar a realização dos testes, porém Crato teve decréscimo na adesão. Assim, a meta de 15% de aumento de testes estabelecida pela Vigilância da Saúde, os que conseguiram alcançá-la foram Crato entre 2019 e 2020, e Barbalha entre 2020 e 2021, já Juazeiro aumentou a adesão, mas não foi suficiente. **Conclusão:** A pandemia teve maior impacto nas cidades de Barbalha e Juazeiro, mas conseguiram se restabelecer, enquanto que o município Crato teve dificuldade pós-pandemia. Desse modo, as cidades podem identificar a problemática e conseguir desenvolver estratégias para reverter o prejuízo.

Palavras-chave: COVID-19; HIV; Pandemia.



INFLUÊNCIA DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS CRÔNICAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DUAS CIDADES DO ALTO DO SERTÃO PARAIBANO

Ana Júlia Siqueira Soares, Gabriel Lucena de Lima, Giovanna Beatriz de Oliveira Guedes, Igor Xavier de Lucena, Karen Dantas Medeiros da Silva, Maria Rita Pereira de Almeida, Wallace Cauã Barbosa da Silva Franco & Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A residência multiprofissional contribui para uma melhoria nos indicadores dos municípios expostos, promovendo um melhor gerenciamento das condições crônicas, promovendo assim, uma melhor aderência ao tratamento e as medidas preventivas. Com isso, foram expostas comparações dos parâmetros de saúde de duas cidades do sertão paraibano. **Objetivo:** Identificar a influência da residência multiprofissional em atenção primária à saúde no diagnóstico de doenças crônicas a partir de uma análise comparativa entre duas cidades do alto do sertão paraibano. **Método:** Trata-se de uma pesquisa documental com indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), programa do Ministério da Saúde no Brasil. **Resultados:** A cidade, na qual contém a residência multiprofissional, obteve-se uma discrepância nos indicadores positivos relacionados às comorbidades, comparado com a que não se obtinha desses profissionais. **Conclusão:** Esse estudo proporcionou o entendimento de que a presença de uma equipe multiprofissional é capaz de mudar a realidade de um município e melhorar os indicadores, haja vista que, há uma detecção mais precoce, integralizada e universalizada das comorbidades.

Palavras-chave: Comorbidades; Doença crônica; Indicadores; Residência multiprofissional.



AIDS NAS CAPITAIS BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CASOS DIAGNOSTICADOS E TESTES REALIZADOS EM 2021

Matheus Araújo Silva, Victor Rafael de Lima Carneiro, Gabriel de Araújo Lima
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é um patógeno transmitido sexualmente que gera a redução das defesas imunológicas da pessoa afetada. Nesse contexto, é necessário ampliar a testagem da população para conter a subnotificação. **Objetivo:** Realizar uma análise comparativa de AIDS nas capitais brasileiras, comparando os casos diagnosticados e os testes realizados no ano de 2021. **Método:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa e documental realizada com dados de 13 indicadores de saúde do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), analisando o número de testes de HIV por capitais brasileiras. Outrossim, foram utilizadas estatísticas do Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de 2020 da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) entre o período de 2015 e 2019. **Resultados:** Nesse contexto, verifica-se que, em geral, o número de notificações de AIDS é inversamente proporcional ao de testes de HIV realizados por capitais. Os resultados mostram ainda que o Brasil teve um aumento de 300.486 testes de HIV em 2021, onde sete capitais não atingiram a meta de crescimento de 15% na testagem, com destaque a região Sul em que todas alcançaram o objetivo programado. **Conclusão:** A partir das informações expostas, foi possível observar que apesar do compromisso e competência de certos estados com a testagem, é necessário aumentar o investimento naqueles que não conseguiram alcançar a meta estipulada, e assim garantir uma maior igualdade na prevenção e promoção da saúde no âmbito nacional.

Palavras-chave: AIDS; Brasil; Diagnóstico; Teste.



NÚMERO DE TESTES DE HIV REALIZADOS NO ANO DE 2021 NA 6ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA - BRASIL

Giovanna Gesley de Oliveira Lira, Luana Lumila Gurgel Freire, Rebeca Ferreira Linhares, Thayná Rakel Quirino Lucena, Vitória Nicolý Andrade dos Santos, Vithória Silvestre Candeia & Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O número de testes do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) apresenta-se como um indicador importante para a prevenção, diagnóstico e promoção de saúde no contexto das doenças infecciosas transmissíveis. **Objetivo:** Identificar o número de testes de HIV, causador da AIDS, realizados na sexta região de saúde do estado da Paraíba no ano de 2021. **Método:** Trata-se de uma pesquisa documental, descritiva caráter quantitativo desenvolvida a partir de materiais elaborados por PQA-VS (Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde). Após a coleta das informações, os dados foram organizados em tabela e gráficos nos programas Microsoft Word 2016® e Microsoft Excel 2016®, a fim de apresentar de maneira didática o número de testes realizados nas 22 cidades pertencentes à 6ª região de saúde do estado da Paraíba - Brasil. Além disso, foram comparados os dados do ano de 2021 com os dados do ano de 2020, com o objetivo de verificar quais bateram a meta estabelecida, que seria um aumento de 15%. **Resultados:** Percebeu-se que 6 municípios não atingiram a meta. Além disso, algumas cidades não notificaram o número de testes realizados, pode-se inferir uma realidade de subnotificações, podendo convergir outros problemas de saúde pública. **Conclusão:** Identificou-se que a proposta de analisar tais resultados caracteriza-se uma ferramenta de auxílio na determinação de cidades que precisam de ações eficientes e eficazes para a prevenção, diagnóstico e promoção de saúde no que tange a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

Palavras-chave: HIV; Indicadores de Saúde; Vigilância de Saúde.



SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA: REALIZAÇÃO DE TESTES NA REGIÃO SERIDÓ, RIO GRANDE DO NORTE - BRASIL - NO PERÍODO DE 2019 A 2022

Felipe Modesto Almeida Rebouças, Jessyca Evilly Nunes da Silva, Livia Araújo
Dantas de Medeiros, Morgana Guadalupe Silva Pereira
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O HIV é um vírus que irá causar a síndrome da imunodeficiência humana - AIDS, que ataca o sistema imunológico do paciente através da invasão ao DNA dos linfócitos, utilizando o mesmo para se multiplicar. A AIDS é uma doença de caráter compulsório e de alta disseminação, na qual se transmite através da relação sexual desprotegida com algum indivíduo infectado. **Objetivo:** Identificar a realização de testes para síndrome da imunodeficiência adquirida na região Seridó, estado do Rio Grande do Norte – Brasil, no período de 2019 a 2022. **Método:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental, com dados secundários, oriundos do PQA-VS (Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde) do Ministério da Saúde – Brasil. **Resultados:** Os dados indicaram os números de realização de testes para HIV na região do Seridó, sendo evidenciado aumentos e diminuições em diferentes cidades durante o ano de 2020 a julho de 2022 (dados parciais). Além disso foi perceptível a identificação do alto índice do município de Caicó, visto que tem influência devido a quantidade da sua população, bem como o possível fato de ser o ápice das festividades durante o carnaval na Região do Seridó. **Conclusão:** Foi evidenciado a disponibilização dos dados relacionados de 2020 até julho de 2022, demonstrando diminuições e aumentos dos números de testes em diferentes municípios do Seridó, sendo perceptível altos índices no município de Caicó. Como limitação do estudo, os dados relacionados ao ano de 2019 estão indisponíveis, problematizando assim um estudo em relação aos anos acometidos pela pandemia da Covid-19.

Palavras-chave: AIDS; HIV; Seridó; Síndrome; Teste.



AVALIAÇÃO DOS TESTES DE SÍFILIS DURANTE A GESTAÇÃO NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE

Kalline Marcelino da Silva Mariz, Arthur de Oliveira Farias, Eduarda Melo Medeiros, Felipe Moraes Balduino da Nobrega, Matheus Dias de Arruda Neto & Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A sífilis é uma doença infecto contagiosa, com progressão crônica, provocada pelo *Treponema pallidum*, possuindo sua transmissão por via sexual. Na ocorrência da enfermidade na mulher em período gravídico, pode ser propagado ao bebê, gerando a sífilis congênita, que resulta em consequências graves, como o parto prematuro. **Objetivo:** Avaliar a testagem da sífilis em gestante na 6ª gerência regional de saúde da Paraíba. **Método:** Trata-se de um estudo retrospectivo de caráter epidemiológico com abordagem descritiva e quantitativa dos testes de sífilis em gestantes, na sexta região de saúde da Paraíba, no ano de 2022, disponíveis no PQA-VS (Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde) do Ministério da Saúde – Brasil. **Resultados:** Observou-se que nas cidades de Mãe D'Água e São José do Sabugi não haviam indicadores da realização de testes de sífilis, já nas cidades de Patos, que é a sede da 6ª Gerência em Saúde, e Santa Luiza, mesmo possuindo informações quanto ao número de testes em gestantes, não atingiram a meta esperada, ou seja, a realização de no mínimo 2 testes por gestante. **Conclusão:** Considerando que a sífilis congênita é classificada como um marcador de qualidade da assistência prestada à saúde materna e fetal e evidenciando que erradicá-la do contexto de saúde do brasileiro é de competência do Ministério da Saúde, faz-se de suma importância a diminuição de casos de sífilis, principalmente na gestação e para isso, é necessária uma assistência mais atenta e qualificada durante o pré natal.

Palavras-chave: Assistência Pré Natal; Gestante; Sífilis.

DESAFIOS DO DIAGNÓSTICO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Gabrielly Lopes Rodrigues, Josefa Izabele Lopes Batista, Nathália Carlos de Freitas Lima Queiroga, Vital Henrique de Almeida Filho
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) consiste no resultado da existência de alterações funcionais e físicas no cérebro, estando diretamente relacionado com o desenvolvimento, seja ele motor, da linguagem e/ou comportamental. Os primeiros sinais podem ser notados em bebês nos primeiros meses de vida, contudo, com o passar dos anos os profissionais de saúde tem enfrentado mais dificuldades no seu diagnóstico. **Objetivo:** Analisar os desafios do TEA a partir de um estudo bibliométrico. **Método:** Revisão bibliométrica realizada na plataforma de busca da National Library of Medicine (NLM/PUBMED), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), portais de periódicos reconhecidos, entre os períodos de 2013 a 2023, selecionando-se 39 artigos que contemplaram a temática proposta. **Resultados:** Baseado na análise das variáveis bibliométricas utilizadas, sendo elas: quantidade de autores/coautores, ano de publicação e país de publicação, as pesquisas demonstraram a existência de diversas confusões e diagnósticos errôneos, como de esquizofrenia e narcisismo do decorrer da vida adulta. **Conclusão:** Com base na pesquisa, faz-se necessário a ampliação dos estudos acerca do tema, visando buscar novos procedimentos de avaliação para facilitar o diagnóstico, minimizar erros e maximizar os resultados de tratamentos.

Palavras-chave: Desafios; Diagnóstico; Saúde; Transtorno do Espectro Autista (TEA).



EFEITO DA MELATONINA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Francisca Evelyn Abreu de Lira, Maria de Fátima Trigueiro da Silva, Isabella Araújo Silva, Marcos Aurelio Fonseca Medeiros
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A melatonina é um dos principais hormônios responsáveis pela regulação do ciclo circadiano de sono e vigília, além de estar relacionado intrinsecamente com o metabolismo, atuando como antioxidante e neuroprotetor. Assim, propagam-se estudos que frisam a influência da sua suplementação na melhora da saúde, na prevenção de patologias neurodegenerativas. **Objetivo:** Analisar os efeitos da melatonina na prevenção de doenças neurodegenerativas a partir de uma revisão bibliométrica. **Método:** Estudo de revisão bibliométrica realizada nas plataformas de busca da National Library of Medicine (NLM/PUBMED), NationalLibrary of Medicine(MEDLINE) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), portais de periódicos reconhecidos, entre os períodos de 2013 a 2023,selecionando-se 32 artigos que contemplaram a temática proposta. **Resultados:** A partir das variáveis bibliométrica, observou-se diversos efeitos benéficos da melatonina na prevenção e tratamento de doenças neurodegenerativas. Nesse ínterim, sua eficácia é evidenciada mediante sua ação na síntese de enzimas antioxidantes, incluindo superóxido dismutase, glutathione peroxidase e glutathione reductase, tal achado mostra o efeito de sua utilização na preservação da integridade neural. Além disso, a melatonina atua na conservação da atividade mitocondrial e diminuição da geração de radicais livres, possuindo uma eficácia complementar a essa terapia neuroprotetora. **Conclusão:** Com base na pesquisa, o uso terapêutico da melatonina possui um valor potencial na preservação e tratamento de doenças neurodegenerativas, possuindo uma atividade neuroprotetora anti oxidativa.

Palavras-chave: Melatonina; Neurodegeneração; Saúde; Tratamento.



A EFICÁCIA DA TIRZEPATIDA NA DIABETES MELLITUS TIPO 2: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Henrique Jorge Rebouças Júnior, Maria Izadora de Caldas Francelino,
Karolainy Formiga da Silva, Ana Luísa Moreira Barreiro de Araújo
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), é uma doença crônica e progressiva caracterizada por resistência insulínica e pela hiperglicemia. Devido a crescente prevalência da doença, muitas vezes associada à obesidade, e suas complicações, a busca por terapias mais eficientes e eficazes tornou-se uma constante. Nesse intuito, surge a Tirzepatida, um agonista duplo de GLP-1 e GIP que apresentou resultados muito promissores tanto na redução da hemoglobina glicada (HbA1c) quanto no peso corporal. **Objetivo:** Analisar a eficácia da Tirzepatida na Diabetes mellitus tipo 2 a partir de um estudo bibliométrico. **Método:** Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliométrica e com abordagem quantitativa, utilizando-se as bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e National Library of Medicine (PUBMED), aplicando-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), selecionou-se 27 artigos obtidos a partir de uma triagem de 165 estudos. **Resultados:** Nos estudos selecionados, a maioria dos autores são médicos, tendo como principal idioma de publicação o inglês. O método de pesquisa prevalente foi a Revisão Sistemática, tendo como ano de maior número de publicações o de 2022. O país de maior prevalência nos estudos é os EUA. No que concerne aos termos mais recorrentes nas pesquisas destacam-se: tirzepatide, diabetes e insulina. **Conclusão:** Houve o mapeamento dos estudos científicos sobre o referido tema, apesar de o número de artigos nessa área ser ínfimo na América Latina e Oceania. Dessa forma, implica-se a necessidade de avanços na qualidade e na quantidade de trabalhos científicos principalmente nas regiões menos prevalentes, visando uma maior robustez nas evidências.

Palavras-chave: Estudos Clínicos; Hiperglicemia; Receptor do Peptídeo Semelhante ao Glucagon 1.



EFEITOS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM PESSOAS COM FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Lamark Dante Valentins Leite Pinheiro, Luís Carlos de Andrade Júnior, Álvaro
Menino Leite, Luan Vieira Agostinho de Sousa
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A prática de exercícios físicos tem sido uma indicação terapêutica no tratamento de pessoas com diagnóstico de fibromialgia. **Objetivo:** Apresentar os efeitos da prática de exercícios físicos por pessoas com fibromialgia a partir de uma revisão bibliométrica. **Método:** Foi realizada uma revisão bibliométrica e o estudo foi desenvolvido de acordo com as leis de Bradford, Lotka e Zipf, utilizando-se os Descritores em Ciências da Saúde em inglês combinados de tal forma <<"exercise" and "fibromyalgia">>. A pesquisa foi efetuada nas bases de dados Medical Publisher e Biblioteca Virtual em Saúde. **Resultados:** Um total de 15 artigos foram selecionados. Os anos de maior destaque nos números de publicações foram os de 2013, 2017 e 2021 ambos correspondem a 20% dos artigos. O periódico em que mais foi publicado estudos foi o Cochrane Database of Systematic Reviews, que correspondeu a 26%. Dentre os autores, a que mais publicou foi a pesquisadora Julia Bidonde. **Conclusão:** A pesquisa demonstra que a prática de atividades físicas pode ser uma grande aliada no cotidiano e melhora da saúde de pessoas que sofrem com a síndrome da fibromialgia uma vez que os pacientes obtiveram redução de dores musculares, inflamações, além de uma diminuição em relação aos sintomas depressivos causados pela enfermidade.

Palavras-chave: Exercícios; Fibromialgia; Saúde.

ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA NA PREVENÇÃO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Caio Vinícius Cavalcante Batista, Gabriel Antonio Mouta Gomes, Íria Mariana
de Medeiros Araújo, Maria Eduarda Dantas Peronico Sobral
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O processo de uma gravidez e o período que a sucede afetam diretamente a vida e a saúde da gestante, mas além disso, é um acontecimento que têm grande importância também para os indivíduos que convivem com ela. Dessa forma, compreende-se que muitas variáveis podem ocorrer nesse momento, inclusive, a depressão pós-parto (DPP). **Objetivo:** Compreender o envolvimento da família na prevenção da depressão pós-parto a partir de uma revisão bibliométrica. **Método:** Foram realizadas buscas nas bases de dados MEDLINE, LILACS e Scielo utilizando os descritores: “depressão pós-parto” e “família”, além de filtrar apenas as publicações feitas do período de 2013 a 2023. No fim, o processo resultou no total de 9 artigos que correspondiam com o objetivo da presente pesquisa e que seguiam os critérios supracitados. **Resultados:** Dentre os resultados obtidos, em suas variáveis bibliométricas pode-se verificar a existência de poucos estudos acerca do envolvimento familiar na DPP, e que há uma ascendência exponencial de estudos voltados para o tema, dessa maneira, há indícios que demonstram interesses por parte das pesquisas e dos pesquisadores em aprofundar esta temática. **Conclusão:** Por fim, fatores psicossociais e econômicos tendem a ser os principais causadores da DPP, entretanto o tema ainda possui margem para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre tais associações e suas frequências.

Palavras-chave: Criança; Depressão pós-parto; Relação familiar.



PANORAMA ATUAL DA PESQUISA EM TRATAMENTO ANTIVIRAL PARA MONKEYPOX: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA ZOONOSE QUE PREOCUPOU O PLANETA

Gabriel dos Santos Medeiros, Ana Carolyn Suassuna de Aquino, Bruna Alves
Olegário, Luiz Antônio Barbosa de Figueiredo
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: Em 2022, a varíola M, zoonose semelhante à varíola convencional, foi declarada emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde. Atualmente, antivirais e vacinas são utilizados para tratamento e prevenção, embora essas estratégias sejam controversas. **Objetivos:** Analisar o panorama atual da pesquisa em tratamento antiviral para monkeypox a partir de uma análise bibliométrica da zoonose que preocupou o planeta. **Método:** Realizou-se uma revisão bibliográfica do tipo bibliometria na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e U.S. National Library of Medicine (PubMed), utilizando os descritores "monkeypox", "antiviral agents" e "treatment", juntamente com o operador booleano "AND". Os critérios de inclusão foram publicações dos últimos 10 anos em inglês, enquanto os critérios de exclusão foram publicações repetidas entre as bases de pesquisa e artigos não relacionados ao tema. Foram selecionadas 255 publicações, das quais 79 atenderam aos critérios adequados para a pesquisa. **Resultados:** Com base em uma análise de natureza quantitativa das publicações, observa-se que a maioria dos artigos foi publicada entre 2022 e 2023, sendo a maior parte dos estudos publicados nos Estados Unidos, seguido do Reino Unido, Suíça, Holanda e Alemanha. O autor com o maior número de publicações é Andrew T. Russo, enquanto a revista com mais publicações é a New England Journal of Medicine. **Conclusão:** A média de produtividade foi de 7,9 artigos por ano. A maioria dos estudos ocorreu entre 2022 e 2023, representando 81% das publicações analisadas. Os Estados Unidos foi o país com o maior número de artigos, correspondendo a 41,7% do total (n=33). Observou-se a ausência de artigos brasileiros sobre o tema. O idioma dominante foi o inglês, conforme os critérios estabelecidos.

Palavras-chave: Antivirais; Brincidofovir; Cidofovir; Tecovirimat; Varíola dos macacos.



A CURA PELA FÉ: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Aruan Kawally Coutinho de Macedo, Ana Lívia Pereira de Sousa, Bárbara Maria Oliveira Bitencourt Nóbrega, Jéssica Helen Alves de Souza, Kalidja da Conceição Rebouças de Souza Guedes, Neidivânia Medeiros da Nóbrega & Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: Nos últimos anos, temos assistido a um aumento significativo no número de novas religiões e correntes esotéricas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Este fato pode ser um reflexo das crescentes demandas diárias das pessoas, bem como sua busca por sentido em um mundo caótico e instável. À medida que a ciência avança com novas descobertas tecnológicas e teorias revolucionárias, algumas pessoas recorrem à religião em busca de respostas para perguntas sobre o que significa estar vivo. **Objetivo:** Mapear as publicações relacionadas à influência da fé como cura na saúde humana. **Método:** Foi realizada uma bibliometria, na qual inicialmente realizou-se a escolha do tema da pesquisa. Em seguida, foram escolhidos os DeCs “faith”, “healing” os quais foram inseridos na plataforma BVS. Ao final, foram selecionados 22 artigos, publicados entre os anos de 2013 a 2023, que se encaixaram no tema proposto. **Resultados:** Destacou-se Lily, como autora principal na maioria das publicações, confirmando a Lei de Lotka. Maior parte dos estudos estavam em inglês, demonstrando a hegemonia dessa língua universal. Ademais, a maior quantidade dos estudos foi escrita no ano de 2019, mostrando o crescimento do interesse por temas relacionados à cura pela fé. Por fim, a maioria dos estudos foi publicada nos EUA, e apesar de existirem revistas que prevalecem, a margem de diferença é muito pequena. **Conclusão:** Tais análises, levam cada vez mais, a pensar que a ordem simbólica desempenha um papel ativo no ordenamento do mundo social, e que mesmo sem confirmações científicas, a fé têm sido um elemento essencial para a cura dos pacientes.

Palavras-chave: Cura milagrosa; Fé; Religião; Saúde.



ESPOROTRICOSE: ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES NO PERÍODO DE 2014 A 2023 E DOS INDICADORES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA GLOBAL

Ana Izabel Lopes Rodrigues Jacó Formiga, Flávia Germanna Cavalcanti Muniz,
José Leudo Freitas Hipólito, José Lacerda das Neves, Maria Augusta Andrade
Feitosa, Mariana Rodrigues Paulo, Victor Régis Leandro Torres
& Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A esporotricose é uma doença ocasionada pelo fungo do gênero *Sporothrix* que entra no organismo por meio de uma ferida na pele. **Objetivo:** Analisar as publicações sobre esporotricose no período de 2014 a 2023 a partir de indicadores da produção científica global. **Método:** Trata-se de uma pesquisa bibliométrica por meio de estudo transversal, com abordagem quantitativa em uma amostra de artigos publicados entre a quarta edição de 2014 a quarta edição de 2023 no acervo virtual da Sociedade Brasileira de Infectologia. **Resultados:** Foram catalogados 266 artigos científicos no período 2014 a 2023, dos quais 39 (14,6%) citam o tema esporotricose. Quanto à localização da produção científica, no Brasil, foi distribuída pelas cinco macrorregiões, tendo quase sua metade na região Sudeste (40%). Sobre a área base de formação dos autores, classificaram-se em quatro especialidades: Infectologia (24 artigos); Dermatologia (3 artigos); médicos com outras especialidades (2 artigos) e outros profissionais (10 artigos). **Conclusão:** Observou-se que a produção brasileira nesta área é altamente lida e citada, uma vez que é crescente o número de citações feitas a artigos nacionais na literatura. Muitos estudos ainda são necessários para uma maior compreensão da esporotricose, principalmente frente às mudanças ocorridas na compreensão deste agravo.

Palavras-chave: Bibliometria; Esporotricose; Infecção.

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH) EM ADULTOS: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Ana Julia dos Santos Brito, Christianny Louyse de Freitas Costa, Laylla Lorena
Araújo Cunha, Maria Eduarda Medeiros Alves, Maria Eduarda Souza
Valdevino, Uyara da Silva Xavier & Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O TDAH adulto pode afetar significativamente a qualidade do funcionamento sócio-ocupacional. O debate sobre o início do TDAH na infância versus adulto ainda precisa ser esclarecido por meio de pesquisas adicionais. **Objetivo:** Analisar o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em adultos a partir de uma revisão bibliométrica. **Método:** Trata-se de uma revisão bibliométrica na qual os artigos foram selecionados a partir de bases de dados eletrônicas como PUBMED e Scielo. A partir desse cruzamento, encontrou-se uma amostra de 42 resultados; dos quais, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, leitura e análise de seus títulos e resumos, 17 foram incluídos por se encaixar com a temática elencada (n=17), sendo essa a amostra final. **Resultados:** Esse resultado revela que ainda existem poucos estudos clínicos e observacionais acerca do tema neste público em específico. Além disso, todos os artigos foram publicados entre 2014 e 2022, o que nos mostra que atualmente, estudos estão sendo realizados para sanar esta lacuna científica acerca principalmente dos impactos do TDAH em adultos. **Conclusão:** Observa-se que nos 17 artigos selecionados da revisão bibliométrica, tem-se a abordagem de vários subtemas como tratamento (29,4%), comorbidades associadas ao TDAH (35%), ricos inerentes ao TDAH em adultos (11,76%), diagnóstico e tratamento (5,88%), comorbidades e diagnóstico (5,88%), manifestações clínicas do TDAH em adultos (5,88%) e qualidade de vida (5,88%).

Palavras-chaves: Transtorno mental; Transtorno neurocognitivo; Saúde do adulto.



A MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (MFC): O PROFISSIONAL E SUA IMPORTÂNCIA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 - ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Lorena Maísa Araújo Rocha Arruda, Ruthy Anny Mendes Dantas, Lucas Matheus Formiga Farias, Breno Leal Martins, Erinaldo Pinto de Almeida Júnior & Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A medicina de Família e Comunidade (MFC) é uma especialidade que envolve o cuidado e conhecimento de aspectos de saudabilidade ocorrendo a prevenção de qualquer dano posterior que envolva enfermidades de origem patológica ou saúde mental. O profissional da MFC desenvolveu papel importante durante o período pandêmico, sendo linha de frente para o levantamento de dados relacionados a COVID-19. **Objetivo:** Investigar a importância do médico da família e comunidade e sua conduta diante o período da pandemia da COVID-19 a partir de um estudo bibliométrico. **Método:** Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica do tipo bibliometria, transversal e com abordagem quantitativa desenvolvido na Web of Science, Science Direct e PubMed. **Resultados:** A partir da análise dos dados bibliométricos pode-se identificar que o médico de MFC foi fundamental para prevenção da propagação do vírus SARS-CoV-2 durante o período pandêmico, com focos de investigação nas comunidades. Além do mais, o MFC busca orientar e aconselhar seus pacientes na busca de melhores condições de uma vida saudável, participarem dos programas de vacinação e realização de check-ups de rotina. **Conclusão:** A categorização dos estudos denotou uma maior importância da MFC como uma especialidade essencial para a atenção primária à saúde e para o tratamento de doenças infectocontagiosas. O estudo bibliométrico demonstrou uma tendência de publicações sobre o reconhecimento da especialidade MFC no período pandêmico e pós pandêmico de Covid-19.

Palavras-chave: Pandemia; Profissional da Saúde; SARS-CoV-2.

REVISTA CIENTÍFICA

Integr@ção

(ISSN Impresso: 1809-8320)

<https://integracao.unifip.edu.br>



v. 4, n. especial 1 (2023): Revista Científica Integr@ção.
(ISSN Impresso: 1809-8320)

01 A 03 DE JUNHO

2023

<https://integracao.unifip.edu.br>